

# آزمون آزمایشی خیلی سبز

دستنده نجات بخوبی

## مرحله اول

## پایه دهم

سال تحصیلی ۱۴۰۳-۰۴ | تاریخ برگزاری: ۲۷ مهر

### نحوه پذیرش

#### فیزیک(۱)

فصل ۱  
صفحه ۱ تا ۲۲

#### ریاضی(۱)

فصل ۱  
(درس ۱، ۲ و ۳)  
صفحه ۱ تا ۲۰

#### زیست‌شناسی(۱)

فصل ۱  
(کفتار و گفتار)  
صفحه ۱ تا ۱۰

#### شیمی(۱)

فصل ۱  
(تا ابتدای جرم اتمی عنصرها)  
صفحه ۱ تا ۱۳

مدت پاسخگویی	نام شماره	از شماره	تعداد سؤال
۳۰ دقیقه	۲۵	۱	۲۵
۲۰ دقیقه	۴۰	۲۶	۱۵
۲۵ دقیقه	۶۰	۴۱	۲۰
۳۵ دقیقه	۸۰	۶۱	۲۰
۱۱۰ دقیقه		۸۰ سؤال	

#### مواد امتحانی

##### زیست‌شناسی

فیزیک

شیمی

ریاضی

#### مجموع

استادی، مشاوران و دانش آموزان گرامی؛

نظرات، پیشنهادات، انتقادات و بازخوردهای خود نسبت به سوالات این آزمون را می‌توانید  
از طریق آیدی [@Kheilisabz\\_edit](https://Kheilisabz_edit) در همه پیام‌رسان‌ها با ما به اشتراک بگذارید.



## زیست‌شناسی دهم

۱- درباره گروهی از مولکول‌های زیستی که از واحدهای آمینو اسیدی ساخته شده‌اند، کدام مورد نادرست است؟

- (۱) کارهای متفاوتی را در بدن جاندار انجام می‌دهند.
- (۲) همگی سبب افزایش مدت زمان انجام واکنش می‌شوند.
- (۳) تنوع عناصر کمتری نسبت به نوکلئیک اسیدها دارند.
- (۴) می‌توانند چند زیر واحد تکراری پشت سر هم داشته باشند.

۲- کدام مورد، در خصوص پزشکی شخصی صحیح است؟

- (۱) روشی است که از قدیم برای تشخیص و درمان بیماری‌ها در حال گسترش بوده است.

(۲) روشی است که با بررسی دنای فرد، تنها می‌تواند باعث شناسایی بیماری‌های ارثی فرد شود.

(۳) روشی است که علاوه بر تشخیص بیماری، می‌تواند روش درمانی منحصر به فرد را ارائه نماید.

(۴) روشی است که به جای بررسی وضعیت فرد، اطلاعات موجود در نوعی مولکول زیستی فسفردار او بررسی می‌شود.

۳- با توجه به اطلاعات کتاب درسی، در خصوص لیپیدهای تولید شده در پایین ترین سطح حیات، کدام مورد صحیح است؟

- (۱) هر کدام از آن‌ها که فاقد اسید چرب است، می‌تواند در ساختار چربی‌ها و روغن‌ها به کار رود.
- (۲) هر کدام از آن‌ها که در ساخت هورمون کاربرد دارد، در غشاء یاخته سازنده نشاسته، غیر قابل مشاهده است.
- (۳) هر کدام از آن‌ها که دارای گلیسرول در بخشی کروی یا بیضی‌شکل است، گروه فسفات نیز دارد.
- (۴) هر کدام از آن‌ها که بیشترین تنوع عنصر را دارد، از این‌ها هر گرم آن حدود دو برابر هر گرم کربوهیدرات است.

۴- جمعیت پروانه مونارک و تأثیر خورشید بر مهاجرت آن‌ها، برای نخستین بار در سطحی از سطوح سازمان‌بایی حیات، به کمک کلنگری، بررسی می‌شود. در خصوص این سطح، چند مورد نادرست است؟

(الف) همه جانداران درون آن، هم‌گونه‌اند و در یک زمان و یک مکان زندگی می‌کنند.

(ب) دارای چندین اجتماع است و در تشکیل سطوح بالاتر از خود نیز شرکت می‌کند.

(ج) شامل بوم‌سازگان‌هایی است که اقلیم و پراکنده‌گی جانداران آن‌ها مشابه است.

(د) از قرارگیری تعدادی از آن‌ها در کنار هم، بلافصله، بالاترین سطح حیات تشکیل می‌شود.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۵- در خصوص نوعی از مولکول‌های زیستی که اطلاعات و راثتی را در خود ذخیره می‌کند، کدام مورد یا موارد زیر را می‌توان بیان نمود؟

(الف) دو رشته به هم پیچیده و مجموعاً چهار نوع زیر واحد دارد.

(ب) تنوع عناصر اصلی سازنده آن، نسبت به فسفولیپیدها بیشتر است.

(ج) با بررسی اطلاعات این مولکول، می‌توان از بروز بیماری‌های ارثی پیشگیری کرد.

(د) به تازگی زیست‌شناسان توانسته‌اند با تغییر در محتوای آن، صفت جدیدی در جانداران ایجاد کنند.

۵ (۲) ج - د

۴ (۴) الف - ب - ج

۱ (۱) ب

۳ (۳) الف - ب

۶- چند مورد از عبارت‌های زیر درباره علوم تجربی و شاخه‌های آن، نادرست است؟

(الف) همه شاخه‌های آن، به بررسی علمی جانداران و فرایندهای زیستی می‌بردازند.

(ب) محققین این علوم، فقط در جستجوی علت(های) پدیده‌های طبیعی و قابل مشاهده هستند.

(ج) فقط در شاخه بررسی کننده حیات، ساختارها و فرایندهای قابل مشاهده و اندازه‌گیری بررسی می‌شوند.

(د) محققان هیچ شاخه‌ای از آن، درباره ارزش‌های هنری یا زشتی و زیبایی پدیده‌های زیستی نظر نمی‌دهند.

۶ (۴)

۱ (۳)

۲ (۲)

۳ (۱)


۷- طبق اطلاعات کتاب درسی، نوعی جانور بی‌مهره به کمک گروهی از یاخته‌های عصبی بدن خود، مسیر مکزیک به جنوب کانادا و بالعکس آن را جهت یابی می‌کند. کدام مورد، در ارتباط با این جانوران به نادرستی بیان شده است؟

- ۱) در شبها و همچنین در هوای ابری، ممکن است جهت یابی آن‌ها مختل شود.
- ۲) به کمک نورون‌هایی، جایگاه خورشید را تشخیص و همواره به سمت آن پرواز می‌کنند.
- ۳) بال‌های زرد یا نارنجی دارند و بخشی از زندگی خود را روی درختان سپری می‌کنند.
- ۴) جمعیت آن‌ها برای انجام یکی از شگفت‌انگیزترین مهاجرت‌ها، هر ساله هزاران کیلومتر را می‌پیمایند.

۸- مطابق با مطلب کتاب درسی، در ارتباط با ویژگی‌هایی که امروزه زیست‌شناسی را به رشته‌ای مترقی، توانا، پویا و امیدبخش تبدیل کرده‌اند، کدام مورد به درستی بیان شده است؟

- ۱) در اخلاق زیستی، موارد مربوط به محramانه‌بودن اطلاعات پزشکی افراد برخلاف تولید هر نوع دارو، بررسی می‌گردد.
- ۲) استفاده از دانش آمار و فنون مهندسی برای شناخت بیشتر سامانه‌های زنده، مربوط به فناوری‌های نوین زیستی است.
- ۳) ساخت حافظه دوتروابایتی و ایجاد امکان انجام محاسبات در سریع‌ترین زمان، از تحولات ایجادشده در بیست سال اخیر است.
- ۴) ایجاد امکان انتقال صفت یک جاندار به جاندار دیگر و تحلیل و بایگانی اطلاعات، تنها از دستاوردهای نگرش بین رشته‌ای است.

۹- شکل زیر سطوح سازمان‌یابی حیات را نشان می‌دهد. با توجه به این شکل، کدام مورد به درستی بیان شده است؟



۱۰- کدام عبارت، در ارتباط با زیست‌شناسان صحیح است؟

- ۱) قطع درختان جنگل‌ها برای استفاده از زمین را از عوامل وقوع سیل، فرسایش خاک و افزایش تنوع زیستی می‌دانند.
- ۲) برای افزایش محصول گیاهان، تنها شناخت تعاملات سودمند گیاهان با عوامل زنده و غیرزنده را مؤثر می‌دانند.
- ۳) دریافته‌اند، پیکر جانداران تک‌یاخته‌ای اجزای اندکی دارد و کل آن، چیزی بیش از مجموع اجزای آن است.
- ۴) معتقدند، با پایدار کردن بوم‌سازگان‌ها، هم‌چنان احتمال کاهش میزان خدمات آن با تغییر اقلیم وجود دارد.

۱۱- در خصوص نیاز مردم جهان به انرژی و تأمین آن، کدام مورد از نظر درستی یا نادرستی، با سایر گزینه‌ها متفاوت است؟

- ۱) بخش عمده انرژی در جهان کنونی، از منابع تجدیدناپذیر مانند بنزین، نفت و گاز تأمین می‌شود.
- ۲) استفاده از پسماند مزارع نیشکر، مثالی از تلاش انسان برای کاهش و استگی به سوخت‌های فسیلی است.
- ۳) تغییرات آب‌وهایی، پیامد مشترک افزایش مصرف سوخت‌های زیستی و از بین رفتن جنگل‌ها است.
- ۴) وجه شباهت و تفاوت نفت با دانه‌های روغنی، به ترتیب، داشتن منشأ زیستی و قابلیت تجدیدپذیری است.

۱۲- براساس اطلاعات کتاب درسی، کدام عبارت در ارتباط با شاخه‌ای از علوم تجربی که به بررسی علمی جانداران و فرایندهای زیستی می‌بردازد،

صحیح است؟

(۱) فقط بعضی از پژوهش‌های انجام‌گرفته در این شاخه، جهت حل مشکلات و مسائل بشر بوده است.

(۲) به کمک آن، با انتقال پروتئین‌های تار عنکبوت به بزها، شیر حاوی این پروتئین تولید می‌شود.

(۳) امروزه دانشمندان این رشته تعریفی کامل و جامع از حیات ارائه داده‌اند و ویژگی‌های آن را ذکر کرده‌اند.

(۴) با پیشرفت‌های آن، بیماری‌هایی مثل قند، به علت روش‌های تشخیصی جدید، دیگر مرگ‌آور نیستند.

**۱۳- کدام مورد، در ارتباط با همه جانداران، صادق است؟**

(۱) در پیکر خود، سطوحی از سازمان‌یابی دارند و منظم‌اند.

(۲) ویژگی‌هایی برای ماندگاری در محیط زندگی خود دارند.

(۳) می‌توانند با افزایش برگشت‌نایدیر تعداد یاخته‌ها، رشد کنند.

(۴) با دفع ادرار، وضع درونی خود را در محدوده ثابتی حفظ می‌کنند.

۱۴- طبق مطلب کتاب درسی، نوعی دی‌ساکارید در جوانه گندم و جو وجود دارد. کدام گزینه مشخصه این مولکول زیستی محسوب نمی‌شود؟

(۱) در ساختار خود دارای دو حلقه شش‌ضلعی یکسان و متصل به هم است.

(۲) با پلی‌ساکارید مورد استفاده برای تولید پارچه، در زیرواحدهای سازنده شباهت دارد.

(۳) همانند پلی‌ساکارید ذخیره‌ای جانوران و قارچ‌ها، تنها یک نوع مونوساکارید دارد.

(۴) با همه لیپیدهای موجود در یک یاخته جانوری، عناصری کاملاً یکسان با نسبت متفاوت دارد.

**۱۵- کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟**

«سطحی از سازمان‌یابی حیات که در آن، برای نخستین بار .....، از سطح ..... پایین‌تر است.»

(۱) عوامل زنده و غیرزنده روی یکدیگر تأثیر می‌گذارند - هفتم

(۲) تعامل بین چند بافت مشاهده می‌شود - سوم

(۳) چندین گونه جانداران وجود دارند - هشتم

**۱۶- در ارتباط با «اخلاق زیستی»، کدام عبارت صحیح است؟**

(۱) نگرش بین رشته‌ای برخلاف اخلاق زیستی، از ویژگی‌های زیست‌شناسی نوین است.

(۲) فقط مسائل مربوط به محروم‌بودن اطلاعات افراد و سلاح‌های زیستی در آن بررسی می‌شوند.

(۳) تولید باکتری‌های مقاوم به پادزیست (آنتی‌بیوتیک) را ناپسند و نوعی سلاح زیستی می‌داند.

(۴) پیشرفت سریع زیست‌شناسی تنها در زمینه مهندسی ژنتیک، زمینه سوء استفاده‌هایی را فراهم کرده است.

**۱۷- براساس متن کتاب درسی، در ارتباط با شکل مقابل، کدام عبارت صحیح است؟**

(۱) در سطوح سازمان‌یابی حیات، یک سطح پایین‌تر از زیست‌کره قرار می‌گیرد.

(۲) محققان، سدسازی نامناسب و احداث بزرگراه را از دلایل خشکشدن کامل آن می‌دانند.

(۳) میزان منابع و سودهایی که در بر دارد، به میزان تولید کنندگان آن وابسته است.

(۴) زیست‌شناسان کشورمان امیدوارند که بتوانند در آینده، برای نخستین بار راهکارهایی برای احیای آن،

ارائه نمایند.



- ۱۸- با توجه به مطلب کتاب درسی، چند مورد از موارد زیر، از جمله اهداف زیست‌شناسان جهت حل مسائل و مشکلات زندگی انسان امروزی است؟
- سوخت‌های زیستی را جایگزین سوخت‌های فسیلی از جمله الکل کنند.
  - نحوه جهت‌یابی جمعیت پروانه مونارک برای انجام مهاجرت را کشف نمایند.
  - یاخته‌های سرطانی را در مراحل اولیه سرطانی شدن، شناسایی و نابود کنند.
  - از بروز بیماری‌های ارشی، پیشگیری کنند و در صورت بروز، آن‌ها را درمان نمایند.

۲ (۲)

۱ (۱)

۴ (۴)

۳ (۳)

«همه جانداران، می‌توانند در سراسر طول عمر خود، ..... ۱۹- کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر، مناسب است؟

- توسط نورون‌های خود، اثر محرک را دریافت و به آن پاسخ دهند
- نها از بخشی از انرژی مواد غذایی، استفاده نمایند
- با حفظ هم‌ایستایی، وضعیت یاخته‌های خود را پایدار نگه دارند
- با انجام تولیدمثل، موجوداتی کم‌وبیش شبیه خود را ایجاد کنند

در ساختار خود علاوه بر مولکول‌های زیستی، محتوى مولکول‌های غیرزیستی نیز ۲۰- چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«گروهی از عواملی که در زیست‌کره قابل مشاهده‌اند،

هستند. هر ویژگی مشترک بین آن‌ها که ..... به طور حتم ..... ۰

- شامل عبور از یک مرحله به مرحله دیگر زندگی است - به معنی بزرگ‌شدن و افزایش برگشت‌ناپذیر ابعاد و تعداد یاخته‌ها است
- نشان‌دهنده نظم و ترتیب در آن‌ها می‌باشد - شامل حداقل هفت سطح مشترک در میان تمام این عوامل در زیست‌کره است
- تأثیر عوامل غیرزندۀ محیطی در بروز آن نقش دارد - تنها شامل پاسخ به این عوامل و بروز سازگاری در برابر آن‌ها است
- اختلال در آن، سایر ویژگی‌ها را نیز مختل می‌کند - شامل مجموعه اعمالی است که سبب پایداربودن وضع درونی جاندار می‌شود

۱ (۲)

۱) صفر

۴ (۴)

۳ (۳)

۲۱- در گروهی از جانداران، از قرارگرفتن تعدادی یاخته در کنار یکدیگر، ابتدا ششمین سطح حیات ایجاد می‌شود. در خصوص این جانداران، کدام عبارت زیر صحیح است؟

- می‌توانند با تولید گامت، جاندارانی کم‌وبیش مشابه خود ایجاد کنند.
- برای حفظ هم‌ایستایی، غلظت مایع بین یاخته‌ای خود را در محدوده‌ای ثابت نگه می‌دارند.
- بخشی از انرژی حاصل از غذای هضم‌شده در دستگاه گوارش آن‌ها، به صورت گرما از دست می‌رود.
- یک سامانه زیستی محسوب می‌شوند که نمی‌توان آن را فقط از طریق مطالعه اجزای سازنده آن توضیح داد.

۲۲- کدام عبارت در ارتباط با سطوح سازمان‌یابی حیات، نادرست است؟

- در ششمین سطح برخلاف هفتمین سطح، همه جانداران موجود در یک مکان مشترک، هم‌گونه هستند.
- در نهمین سطح برعكس هشتمین سطح، انواعی از اجتماعات مربوط به موجودات زنده وجود دارد.
- در دومین سطح برخلاف اولین سطح، می‌توان با استفاده از کل‌نگری، ارتباط میان اجزای سامانه زیستی را بررسی نمود.
- در هشتمین سطح برعكس هفتمین سطح، امکان بررسی همزمان تعاملات عوامل زنده و غیرزنده با گیاهان برای افزایش محصول وجود دارد.

۲۳- با توجه به اطلاعات کتاب درسی، در ارتباط با چهار گروه اصلی مولکول‌های سازندهٔ یاخته، چند مورد درست است؟

«هر نوع مولکول زیستی که .....، به طور حتم .....».

الف) در انتقال مواد در خون نقش دارد - تنوع زیرواحدهای سازندهٔ آن از مولکول معروف به قند شیر، بیشتر است

ب) در قند و شکر وجود دارد - زیرواحدهای متنوع تری از مالتوز دارد و هر زیرواحد آن، یک اتم کربن بیشتر از ریبوز دارد

ج) ذخیرهٔ گلوکز در کبد و ماهیچهٔ انسان است - سه نوع عنصر مشترک با همهٔ مولکول‌های زیستی دارد

د) در سیبازمینی، از تعداد زیادی مونوساکارید ساخته شده است - در کاغذسازی، فاقد استفاده است

۲ (۴)

۴ (۳)

۱ (۲)

۳ (۱)

۲۴- کدام عبارت، صحیح است؟

۱) هر مولکول زیستی که اتم نیتروژن دارد، کارهایی مانند انقباض ماهیچه و عملکرد آنزیمی دارد.

۲) هر مولکول زیستی که عنصر فسفر دارد، دارای دو اسید چرب است که خمیدگی‌هایی دارند.

۳) هر لیپیدی که در ساختار غشای جانوران دیده می‌شود، در ساختار برخی هورمون‌ها نیز وجود دارد.

۴) هر مولکول زیستی که چهار نوع عنصر دارد، در ذخیرهٔ اطلاعات و راثتی فاقد نقش است.

۲۵- در ارتباط با خدمات زیست‌شناسی برای انسان، چند مورد نادرست است؟

الف) به علت تأمین غذاي انسان به طور مستقيم یا غیرمستقيم از گیاهان، افزایش شناخت گیاهان تنها راه برای تأمین غذاي بیشتر است.

ب) پایدار کردن بوم‌سازگان، تنها در شرایطی زندگی انسان را ارتقا می‌دهد که با تغییر اقلیم، تولید کنندگی آن کاملاً ثابت بماند.

ج) گیاهان همانند اغلب جانداران دیگر، در محیطی پیچیده، رشد می‌کنند و محصول می‌دهند.

د) با توجه به گرمایش و آلودگی زمین، بهبود سوختهای فسیلی از اهداف زیست‌شناسان است.

۱ (۴)

۲ (۳)

۳ (۲)

۴ (۱)

## فيزيك دهم

۲۶- در مدل سازی کدام یک از موارد زیر، می‌توانیم از اثر مقاومت هوا صرف نظر کنیم؟

- (الف) افتادن برگ درخت
- (ب) حرکت توپ بستکبال به سمت حلقه
- (پ) هل دادن یک جسم نسبتاً بزرگ
- (ت) سقوط چتر بازی با چتر بازشده
- (۱) «الف» و «پ»
- (۲) «ب» و «پ»
- (۳) «ب» و «ت»
- (۴) «الف» و «ت»

۲۷-  $A = BC + D$  کمیت‌های فیزیکی هستند و رابطه  $A = BC + D$  بین آن‌ها برقرار است. اگر یکای کمیت  $C$  در SI

ثانیه و کمیت  $D$  سرعت باشد،  $B$  چه کمیتی است؟

- (۱) سرعت
- (۲) شتاب
- (۳) زمان
- (۴) طول

۲۸- مقدار دو کمیت فیزیکی  $\frac{mN}{ng}$  و  $\frac{mg}{m.s^2}$  است. مقدار این دو کمیت بر حسب یکاهای SI

به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

- |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| $1/7 \times 10^6$ و $5/2 \times 10^5$ | $1/7 \times 10^3$ و $5/2 \times 10^2$ |
| $1/7 \times 10^3$ و $5/2 \times 10^5$ | $1/7 \times 10^6$ و $5/2 \times 10^3$ |

۲۹- کامیونی حامل ۲ خروار هندوانه و ۲۵۰ من تبریز طالبی است. جرم کل بار این کامیون چند مثقال است؟

- |   |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
| (۱) خروار = ۱۰۰ من تبریز و ۱ من تبریز = ۴۰ سیر و ۱ سیر = ۱۶ مثقال | (۲) ۲۸۸۰۰۰ | (۳) ۱۲۸۰۰۰ | (۴) ۱۶۰۰۰۰ | (۱) ۱۴۴۰۰۰ |
|---|------------|------------|------------|------------|

۳۰- سریع ترین رشد گیاه متعلق به گیاهی موسوم به هسپریوکا است که در مدت ۱۴ روز،  $7/7 m$  رشد می‌کند.

آهنگ رشد این گیاه بر حسب میکرون بر ثانیه تقریباً چه قدر است؟

- |         |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|
| (۱) ۱۸۳ | (۲) ۷۲/۴ | (۳) ۶/۱۲ | (۴) ۳/۰۶ |
|---------|----------|----------|----------|

۳۱- یک میکروقرن تقریباً چند درصد بیشتر از یک سخنرانی ۵۰ دقیقه‌ای است؟ (یک سال را ۳۶۵ روز در نظر بگیرید).

- |         |        |       |       |
|---------|--------|-------|-------|
| (۱) ۰/۵ | (۲) ۱۰ | (۳) ۲ | (۴) ۵ |
|---------|--------|-------|-------|

۳۲- طول کل خطوط انتقال نفت خام، گاز و سایر فراورده‌های سوختی در ایران  $389 \times 10^5 m$  و زمان تقریبی بین دو

ضربان عادی قلب  $85/0$  است. طول کل خطوط انتقال بر حسب کیلومتر و زمان تقریبی بین دو ضربان عادی قلب

بر حسب میلی ثانیه و به صورت نمادگذاری علمی به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

- |  |   |
|--|---|
| (۱) $8 \times 10^7$ و $3/89 \times 10^4$ | (۲) $8 \times 10^{-1}$ و $3/89 \times 10^4$ |
| (۳) $8 \times 10^2$ و $3/89 \times 10^7$ | (۴) $8 \times 10^2$ و $3/89 \times 10^4$    |

محل انجام محاسبات

۳۳- آزمایشگری در حال اندازه‌گیری طول یک جسم است. کدام موارد از عبارت‌های زیر، خطای اندازه‌گیری را کاهش می‌دهد؟

(الف) استفاده از ابزار رقمی (دیجیتال)

(ب) استفاده از ابزار دقیق

(پ) استفاده از ابزار مدرج (درجه‌بندی شده)

(ت) روش صحیح اندازه‌گیری

۴) «الف» و «ب»

۳) «الف» و «ت»

۲) «ب» و «ت»

۱) «ب» و «پ»

۳۴- کدام یک از ابزارهای اندازه‌گیری زیر، ریزسنج نام دارد و دقت اندازه‌گیری کولیس چند سانتی‌متر است؟



(الف)



(ب)

۰ / ۰۰۱ ۴) الف -

۰ / ۰۱ - ۳) ب -

۰ / ۰۱ - ۲) الف -

۰ / ۰۰۱ ۱) ب -

۳۵- دو کره A و B از یک سنگ همگن برشیده شده‌اند. شعاع کره A  $4/5\text{ cm}$  و جرم کره B، برابر جرم کره A است.

شعاع کره B چند سانتی‌متر است؟

۳۶) ۴

۹) ۳

۱۸) ۲

۲/۲۵) ۱

۳۶- چگالی جسم A، نصف چگالی جسم B و حجم  $160\text{ g}$  از جسم B، برابر با  $20\text{ cm}^3$  است. جرم  $15\text{ cm}^3$  از جسم A چند گرم است؟

۱۲۰) ۴


$\frac{15}{16}$

۶۰) ۲

۲۴۰) ۱

۳۷- مطابق شکل زیر، دو مایع مخلوط‌نشدنی با چگالی‌های  $\rho_1 = 1\text{ g/cm}^3$  و  $\rho_2 = 1/2\text{ g/cm}^3$  در یک استوانه با

شعاع مقطع  $1\text{ m}$  ریخته شده است. جرم کل مایع‌های درون استوانه چند کیلوگرم است؟



۱۱۶۱/۸) ۱

۱۲۵۶) ۲

۳۷۰) ۳

۴۰۰) ۴

محل انجام محاسبات

۳۸- یک ظرف استوانه‌ای شکل با مساحت مقطع  $5\text{ cm}^2$  حاوی  $1/5\text{ L}$  آب است. درون این ظرف، یک قطعه فلزی با جرم  $6000\text{ kg/m}^3$  و چگالی  $5\text{ g/cm}^3$  و یک قطعه فلزی دیگر با جرم  $54\text{ g}$  و چگالی  $6000\text{ kg/m}^3$  را می‌اندازیم. در این حالت، ارتفاع آب نسبت به قبل از انداختن قطعه‌ها چند سانتی‌متر تغییر کرده است؟ (هر دو قطعه درون آب فرومی‌روند و  $1\text{ g/cm}^3 = \rho_{\text{آب}}$  است).


۳) ۴

۱۶/۸(۳)

۷/۸(۲)

۱۲(۱)

۳۹- نمودار حجم بر حسب جرم دو جسم A و B مطابق شکل زیر است.  $m_A$  چند گرم است؟ ( $\rho_B = 3600\text{ kg/m}^3$ )



۱۶(۱)

۱۴۴(۲)

۴۸(۳)

۸۱(۴)

۴۰- دو مایع A و B و هر یک با جرم  $m$  را داخل ظرفی می‌ریزیم و بایکدیگر مخلوط می‌کنیم، سپس مایع A با جرم  $m$  را با مایع مخلوطشده در ظرف دیگری می‌ریزیم و با هم مخلوط می‌کنیم. چگالی مخلوط نهایی چند گرم بر لیتر است؟ ( $\rho_B = 2\text{ g/cm}^3$ ,  $\rho_A = 1\text{ g/cm}^3$ )

۱۲۰۰(۴)

۱/۵(۳)


۱/۲(۲)

۱۵۰۰(۱)

محل انجام محاسبات

## شیمی دهم

۴۱- نمودار زیر مربوط به درصد فراوانی سه عنصر فراوان‌تر یکی از سیاره‌های زمین یا مشتری است. با توجه به آن، کدام مطلب درست است؟



۱) نمودار داده شده، مربوط به مشتری است و A همان هیدروژن است.

۲) نمودار داده شده مربوط به زمین است و D همان کربن است.

۳) عنصر X، جزء عنصرهای مشترک در بین ۸ عنصر فراوان‌تر دو سیاره زمین و مشتری است.

۴) عنصر A، نخستین عنصری است که پس از مهبانگ، پا به عرصه جهان گذاشته است.

۴۲- کدام مطلب نادرست است؟


۱) شمار عناصر طبیعی در جدول تناوبی، به تقریب  $5/3$  برابر شمار عناصر ساختگی در آن است.

۲) خواص شیمیایی عنصری با عدد اتمی ۹، شبیه به خواص شیمیایی  $X_{17}$  است.


۳) در اتم  $E^A_Z$ ، اگر مقدار  $Z - A$  برابر تعداد پروتون‌ها باشد، شمار هر یک از ذره‌های زیراتومی در اتم E برابر است.

۴) تعداد نوترون‌ها در پایدارترین ایزوتوپ طبیعی لیتیم، برابر با تعداد ایزوتوپ‌های طبیعی هیدروژن است.

۴۳- شمار الکترون‌های  $A^{+8}$ ،  $B^{-8}$  برابر شمار نوترون‌های کدام گونه است؟



۴۴- در شکل زیر، ایزوتوپ‌های طبیعی هیدروژن و منیزیم بر حسب افزایش پایداری آن‌ها مرتب شده‌اند. بر این اساس، کدام موارد از مطالب زیر درست است؟ (n، نماد نوترون و p، نماد پروتون است).



ت) ایزوتوپ D نسبت به سایر ایزوتوپ‌های منیزیم در طبیعت، فراوانی کم‌تر و عدد جرمی بزرگ‌تری دارد.

۱) الف - ت

۲) الف - پ

۳) ب - پ

۴) ب - ت

۴۵- برای یون  $Y^{4+}$ ، رابطه  $A = 2/5Z + 2$  برقرار است. اگر یون  $Y^{2+}$ ، در مجموع دارای ۲۸۷ ذره زیراتومی باشد، نسبت شمار الکترون‌ها به نوترون‌ها در یون  $Y^{4+}$  کدام است؟

۱)  $0/78$

۲)  $0/64$

۳)  $0/624$

۴)  $0/396$

محل انجام محاسبات

۴۶- کدام یک از موارد زیر، درباره ایزوتوب‌های ساختگی هیدروژن درست است؟

۱) سبک‌ترین آن‌ها، نیم‌عمری در حدود ۱۲ سال دارد.

۲) ناپایدارترین آن‌ها، در هسته خود ۷ نوترون دارد.

۳) با افزایش شمار نوترون‌های آن‌ها، نیم‌عمر آن‌ها به طور منظم کاهش می‌یابد.

۴) در همه آن‌ها، نسبت عدد جرمی به عدد اتمی بزرگ‌تر از ۳ است.

۴۷- چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ (نماد اتم‌های نیتروژن و اکسیژن به ترتیب به صورت  $N^{14}$  و  $O^{16}$  است).

- در دود سیگار و قلیان، مقدار بسیار کمی مواد پرتوزا وجود دارد که ممکن است خطرناک باشند.

- پاسخ به پرسش «جهان کنونی چگونه شکل گرفته است؟» در قلمرو علوم تجربی نمی‌گنجد.

- در هر واحد از یون  $NO_3^-$ ، در مجموع ۶۳ ذره زیراتومی باردار وجود دارد.

- از مواد پرتوزا می‌توان در پژوهشی استفاده کرد ولی نمی‌توان از آن‌ها در تولید انرژی الکتریکی بهره گرفت.


۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۴۸- با توجه به جدول زیر، هر یک از توضیحات زیر را به ترتیب به کدام عنصرها می‌توان نسبت داد؟ (نماد عنصرها فرضی است).



- تفاوت شماره دوره و گروه آن در جدول برابر ۱۲ است.

- تفاوت عدد اتمی آن با تعداد کل عنصرهای شناخته شده، برابر با تعداد عنصرهای طبیعی است.

- با عنصری که اتم آن ۱۶ الکترون دارد، خواص شیمیایی مشابهی دارد.

X, A, D (۲)

E, A, X (۱)

A, E, D (۴)

E, D, X (۳)

۴۹- در نمونه‌ای شامل ۵۰۰ اتمی شامل ایزوتوب‌های طبیعی منیزیم ( $Mg^{24}$ ), شمار نوترون‌ها، ۱۵۵ واحد بیشتر از شمار پروتون‌ها

است. اگر در صد فراوانی سبک‌ترین ایزوتوب در این نمونه برابر ۸۰٪ باشد، در صد فراوانی سنگین‌ترین ایزوتوب کدام است؟

۱۲ (۴)

۱۱ (۳)

۱۰ (۲)

۹ (۱)

۵۰- اگر تفاوت شمار نوترون‌ها و الکترون‌هادر یون  $X^{139+}$  برابر ۲۸ باشد، کدام اتم رامی‌توان ایزوتوب اتم X در نظر گرفت؟

$^{142}E$  (۴)

$^{141}M$  (۳)

$^{139}D$  (۲)

$^{140}A$  (۱)

محل انجام محاسبات

۵۱- درستی یا نادرستی مطالب زیر، به ترتیب چگونه است؟

- رادیوایزوتوپ فسفر، جزء رادیوایزوتوپ‌هایی است که در ایران تولید می‌شود.
- اختلاف تعداد دوره و گروه در جدول تناوبی، برابر با ۹ است.

• فراوان ترین ایزوتوپ اورانیم،  $U^{235}$  است که به عنوان سوخت در راکتورهای اتمی استفاده می‌شود.

• با وجود پیشرفت در علم شیمی و فیزیک، انسان هنوز نمی‌تواند عنصرهای دیگر را به طلا تبدیل کند.

(۱) درست - درست - نادرست - نادرست

(۴) نادرست - درست - درست - درست

(۳) نادرست - نادرست - درست - درست

.....۵۲- اگر اتم مربوط به عنصر E یک رادیوایزوتوپ باشد، حداقل شمار نوترون‌ها در هسته هر اتم از آن برابر با

بوده و نسبت عدد جرمی آن به مقدار  $\frac{A-Z}{Z}$  در اتم  $X^{72}$  برابر با ..... است.

(۱) ۱۴۴ - ۱۹۰ (۲) ۱۴۶ - ۱۹۲ (۳) ۱۴۶ - ۱۹۲ (۴) ۱۴۶ - ۱۹۰

۵۳- با دانستن موقعیت یک عنصر در جدول دوره‌ای، کدام مورد را درباره آن عنصر نمی‌توان به دست آورد؟

(۱) شمار الکترون‌ها (۲) عدد اتمی (۳) شمار نوترون‌ها (۴) شماره دوره

۵۴- با توجه به شکل مقابل، چند مورد از عبارت‌های زیر درست است؟

• b. یک توده سرطانی را نشان می‌دهد که در اطراف آن، مواد c و d تجمع می‌یابند.

• c. نشان‌دهنده گلوکز نشان‌دار بوده و فاقد اتم پرتوزا است.

• با فرایند انجام گرفته در شکل، توده سرطانی را می‌توان درمان کرد.

• قسمت a، آشکارساز پرتو بوده و پرتوهای گسیل شده از d و c را جذب می‌کند.

(۱) ۲ (۲) ۴ (۳) ۳

۵۵- شکل زیر، برخی از عناصر جدول تناوبی را نشان می‌دهد. کدام یک از عبارت‌های زیر در رابطه با این عناصر نادرست است؟

(نماد عناصر فرضی است).

A			L	X	
B		M	D		
				E	

(۱) تفاوت عدد اتمی دو عنصر A و B برابر با تعداد پروتون‌ها در اتم X است.

(۲) اگر L تبدیل به یون  $L^{-3}$  شود، عنصر D نیز با از دست دادن الکترون به  $D^{-3}$  تبدیل می‌شود.

(۳) مجموع شمار ذرهای زیراتمی باردار در اتم E برابر با ۲۳۶ است.

(۴) در اتم  $M^{27}$ ، ۱۴ نوترون وجود دارد.

محل انجام محاسبات

۵۶- درستی یا نادرستی کدام گزینه با دیگر گزینه‌ها متفاوت است؟

- ۱) جدول دوره‌ای امروزی براساس افزایش جرم اتمی عنصرها مرتب شده است.
- ۲) پسماند راکتورهای اتمی، خطرناک نیست و خاصیت پرتوزایی ندارد.
- ۳) گاز اکسیژن ( $O_2$ ) را بخلاف هلیم ( $He$ )، نمی‌توان عنصر در نظر گرفت.
- ۴) هنگام عکسبرداری از زندان‌ها در رادیولوژی، با پوشش‌های سربی از غده تیروئید محافظت می‌شود.

۵۷- کدام یک از موارد زیر در رابطه با عنصر تکنسیم درست است؟

- ۱) شناخته شده‌ترین فلز پرتوزا است و در تصویربرداری پزشکی کاربرد دارد.
- ۲) نماد این عنصر به صورت  $Tc^{99}$  بوده و نسبت  $\frac{n}{p}$  در آن بیشتر از این نسبت در  $H^3$  است.
- ۳) غده تیروئید به همراه جذب یون یدید، یون تکنسیم را نیز جذب می‌کند.
- ۴) در واکنشی که تکنسیم توسط آن تولید می‌شود، همانند واکنش تبدیل هیدروژن به هلیم پس از مهبانگ، انرژی آزاد می‌شود.

۵۸- چند مورد از ویژگی‌های زیر در ایزوتوپ‌های مربوط به یک عنصر، یکسان است؟

• خواص شیمیایی

• چگالی

• نسبت شمار الکترون‌ها به پروتون‌ها

• مجموع ذرات داخل هسته اتم

• جایگاه آن‌ها در جدول دوره‌ای

۵ (۴)

۴ (۳)

۳ (۲)

۲ (۱)

۵۹- عنصر X دارای سه ایزوتوپ با جرم‌های سبک، متوسط و سنگین است؛ به طوری که با دریافت دو الکترون توسط هر اتم از ایزوتوپ سنگین‌تر، عدد جرمی این ایزوتوپ دو برابر تعداد الکترون‌های آن می‌شود. اگر به ازای ۲ ایزوتوپ سبک‌تر، ۴ ایزوتوپ سنگین‌تر و به ازای هر ایزوتوپ سبک‌تر، ۲ ایزوتوپ با جرم متوسط در نمونه X وجود داشته باشد، درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین‌تر کدام است و در هر اتم از آن، اختلاف شمار نوترон‌ها و پروتون‌ها چقدر است؟

۵ - ۴۰ (۴)

۴ - ۴۰ (۳)

۴ - ۵۰ (۲)

۵ - ۵۰ (۱)

۶- کدام مورد نادرست است؟

- ۱) اطلاعاتی که توسط فضاییمهای وویجر به زمین مخابره می‌شوند، می‌توانند شامل نوع عنصر سازنده سیاره‌ها باشند.
- ۲) با انجام واکنش‌های هسته‌ای درون ستاره‌ها، عناصر سبک‌تر به عناصر سنگین‌تر تبدیل می‌شوند.
- ۳) با کاهش دما پس از مهبانگ، عناصر سبک‌تر متراکم شدن و مجموعه‌هایی سنگی را پدید آورند.
- ۴) انرژی آزادشده در واکنش‌های هسته‌ای آن قدر زیاد است که می‌تواند صدها میلیون تن فولاد را ذوب کند.

محل انجام محاسبات

## ریاضی دهم

۶۱- فرض کنید  $A = (-1, 3)$  و  $B = (1, 5)$  باشد، در این صورت مجموعه اعضای که فقط متعلق به یکی از این دو مجموعه هستند، کدام است؟

$$[3, 5) \quad (-1, 5) - \{1, 3\} \quad (-1, 5) \quad (-1, 1] \cup [3, 5) \quad 1$$

۶۲- اگر  $A = \{x \in \mathbb{N} \mid a \leq x < b\}$  شامل چند عضو است؟

$$2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 1$$

۶۳- فرض کنید  $a+1$  و  $2a+2$  است. حدود  $a$  کدام باشد تا  $2 \in A$  و  $3 \notin A$  باشد؟

$$\left[\frac{1}{2}, 5\right) \quad \left[\frac{1}{2}, 4\right) \quad [2, 3) \quad \left[\frac{1}{2}, 1\right) \quad 1$$

۶۴- حدود  $a$  کدام باشد تا  $(a-1, 3a) \subseteq (6, 2a+8)$  باشد؟

$$[7, 8) \quad (5, 9) \quad [5, 6) \quad [6, 9) \quad 1$$

۶۵- اگر  $A_n = \{m \in \mathbb{Z} \mid n^2 - 1 < m < 3^n + 2^n + 1\}$  باشد، آن‌گاه تعداد اعضای  $(A_4 - A_3)$  چندتا از تعداد

اعضای  $(A_2 - A_1)$  بیشتر است؟

$$48 \quad 54 \quad 62 \quad 68 \quad 1$$

۶۶- اگر  $C = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15\}$ ،  $B = \{3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\}$ ،  $A = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$  باشد، آن‌گاه کدامیک

از اعداد زیر به  $(A - B) \cup (B - C)$  تعلق ندارد؟

$$15 \quad 9 \quad 8 \quad 6 \quad 1$$

۶۷- مجموعه  $(A' - B) \cup (A - B')$  با کدامیک از مجموعه‌های زیر همواره برابر است؟

$$A - B' \quad A - B \quad A \quad A' - B' \quad 1$$

۶۸- اگر  $A - B = A$  باشد، آن‌گاه کدام مجموعه، زیرمجموعه هر مجموعه دلخواهی مثل  $C$  است؟

$$(A \cup B)' \quad A \cap B' \quad (A' \cup B')' \quad A' \cap B \quad 1$$

۶۹- کدامیک از مجموعه‌های زیر نامتناهی است؟

الف) اعداد طبیعی که می‌توان آن‌ها را به صورت مجموع مربعات سه عدد طبیعی دیگر نوشت.

ب) اعداد گویایی مانند  $\frac{a}{b}$  که از  $\frac{a}{b+1}$  کوچک‌تر هستند. ( $a, b \in \mathbb{N}$ )

$$4) \text{ هیچ کدام} \quad 3) \text{ الف و ب} \quad 2) \text{ فقط ب} \quad 1) \text{ فقط الف}$$

محل انجام محاسبات

۷۰- اگر  $C = \left\{ \frac{1}{2n+1} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$  و  $B = \left\{ \frac{n}{2^n} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$  ،  $A = \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$  باشند، آن‌گاه کدام یک از مجموعه‌های زیر، متناهی است؟

$$A \cap B \quad (4)$$

$$A \cap B' \quad (3)$$

$$B - C \quad (2)$$

$$B \cap C \quad (1)$$

۷۱- فرض کنید  $\{x \mid 0 \leq x + 2 < 4a + 2\} = B$  باشند. اگر مجموعه‌های  $A = \{x \mid a - 2 < x \leq 6a\}$  و  $B$  جدا از هم باشند، آن‌گاه حدود  $a$  کدام است؟

$$\left( \frac{-2}{5}, +\infty \right) \quad (4)$$

$$\left( \frac{-2}{5}, \frac{-1}{3} \right) \quad (3)$$

$$(-\infty, -1) \quad (2)$$

$$\left( -\infty, \frac{-2}{3} \right) \quad (1)$$

۷۲- اگر  $n(A \cup B) = 38$  و  $n(A - B) = 3n(B - A) = 4n(A \cap B)$  باشد، تعداد اعضای  $A$  کدام است؟

$$22 \quad (4)$$

$$28 \quad (3)$$

$$30 \quad (2)$$

$$26 \quad (1)$$

۷۳- در یک کلاس ۳۶ نفره، ۱۵ نفر فقط به فوتبال علاقه‌مند هستند. اگر ۱۲ نفر به والیبال علاقه داشته باشند، چه تعداد از دانش‌آموزان به هیچ‌کدام از این دو رشته، علاقه‌مند نیستند؟

$$9 \quad (4)$$

$$8 \quad (3)$$

$$7 \quad (2)$$

$$6 \quad (1)$$

۷۴- ۲۰ درصد از جمعیت زنان یک شهر، هیچ‌گونه علاقه‌ای به آشپزی ندارند. اگر ۳۰ درصد مردانی که به آشپزی علاقه‌مندند، برابر با ۶ درصد کل جامعه باشند، آن‌گاه چنان‌چه فقط ۲۵ درصد مردان جامعه به آشپزی بی‌علاقه باشند، نسبت جمعیت مردان به زنان در این شهر کدام است؟

$$\frac{4}{11} \quad (4)$$

$$\frac{1}{4} \quad (3)$$

$$\frac{1}{3} \quad (2)$$

$$\frac{5}{13} \quad (1)$$

۷۵- جمله‌های سوم و هفتم یک الگوی خطی به ترتیب ۴ و ۱۰ هستند. جملهٔ یازدهم دنباله کدام است؟

$$17 \quad (4)$$


$$16 \quad (3)$$

$$15 \quad (2)$$

$$14 \quad (1)$$

۷۶- در الگوی زیر، تعداد نقطه‌ها در شکل پانزدهم کدام است؟

$$48 \quad (1)$$



$$49 \quad (2)$$

$$47 \quad (3)$$

$$50 \quad (4)$$


۷۷- در الگوی زیر، شکل نهم از چند نقطه تشکیل شده است؟

$$123 \quad (1)$$

$$135 \quad (2)$$

$$144 \quad (3)$$

$$145 \quad (4)$$



محل انجام محاسبات

۷۸- در یک الگوی خطی، مجموع پنج جمله اول، برابر ۱۲ است. اگر مجموع جملات ششم تا دهم برابر ۱۸ باشد، فاصله دو جمله متوالی کدام است؟

$$\frac{3}{20} \quad (4)$$

$$\frac{3}{25} \quad (3)$$

$$\frac{3}{10} \quad (2)$$

$$\frac{6}{25} \quad (1)$$

۷۹- در یک الگوی خطی جمله های ششم و دهم به ترتیب  $2x + 14$  و  $x + 14$  هستند. در این الگو، جمله پنجم چند واحد از جمله دوم بزرگتر است؟

$$9 \quad (4)$$

$$8 \quad (3)$$

$$6 \quad (2)$$

$$4 \quad (1)$$

۸۰- در دنباله  $a_m = \frac{3}{14}a_4$ ، اگر  $a_n = \frac{5n+10}{2n-7}$  باشد، مقدار  $m$  کدام است؟

$$8 \quad (4)$$

$$5 \quad (3)$$

$$7 \quad (2)$$

$$4 \quad (1)$$

مهنمترین ویژگی های آزمون های خیلی سبز در پایه های دهم و یازدهم:

- ۱- برگزاری دست کم یک آزمون در ماه بر اساس روال تدریس در مدرسه
- ۲- برگزاری آزمون های ویژه برای زمان های خاص (میان ترم، ترم، پس از عید و...)
- ۳- امکان جبران عقب ماندگی های دوره همطالب برای ثبتیت آنها

پاسخ نامه تشریحی آزمون را ساعت ۱۶ از صفحه شخصی خودتان در سایت آزمون خیلی سبز دریافت کنید.



[azmoon.kheilisabz.com](http://azmoon.kheilisabz.com)

محل انجام محاسبات

# پاسخ نامه آزمون آزمایشی خلیسابت

دستنده بجز بجز

## مرحله اول

## پایه دهم

سال تحصیلی ۱۴۰۳-۰۴ | تاریخ برگزاری: ۲۷ مهر / ۱۴۰۳

نام درس	طراحان به ترتیب حروف الفبا
زیستشناسی (۱)	کریم آذرمنی - علی احمدی - علیرضا تقی - امیرضا جباره - محمد زارع - امیر گیتی پور - یوسف متخدی
فیزیک (۱)	علیرضا گونه - علیرضا عبداللهی - فرزاد نامی
شیمی (۱)	محمد کهنه پوشی - یاسر عبداللهی
ریاضی (۱)	بهاره خزانی - علی شهرابی - امید غبور - میلاد منصوری

نام درس	مسئول درس	گزینشگر	مؤلف پاسخنامه	کارشناسان علمی	به ترتیب حروف الفبا	ویراستاران
زیستشناسی (۱)	موسی بیات امیر گیتی پور	امیر گیتی پور	علی محمد باطبی	علیرضا تقی	علیرضا تقی - سپیده ناظری	
فیزیک (۱)	علیرضا گونه	علیرضا جباری	ماهان فنی فر	ماهان فنی فر	مدیا عیدی - ماهان فنی فر ابوالفضل ناصری	
شیمی (۱)	یاسر عبداللهی	محمد کهنه پوشی	مهرسا خاکی	علیرضا تقی	هومن زندی - صدرا عبادی محسن مجذوبی	
ریاضی (۱)	شقاقیق راهبریان	میلاد منصوری	سجاد داودلوب	علی شهرابی	مهدی خوش‌نویس منصور زرکش اصفهانی ماهان فنی فر - ابوالفضل ناصری	

سرپرست محتوایی: فاطمه آقاجانپور



## زیست‌شناسی دهم

۱

درباره گروهی از مولکول‌های زیستی که از واحدهای آمینواسیدی ساخته شده‌اند، کدام مورد نادرست است؟

## پروتئین‌ها

- ۱) کارهای متفاوتی را در بدن جاندار انجام می‌دهند.
- ۲) همگی سبب افزایش مدت زمان انجام واکنش می‌شوند.
- ۳) تنوع عناصر کم‌تری نسبت به نوکلئیک اسیدها دارند.
- ۴) می‌توانند چند زیر واحد تکراری پشت سر هم داشته باشند.

## زیرمبتد، فصل ا-گفتار ۲-پروتئین‌ها

## پاسخ خیلی تشریحی ✓


بروتئین‌ها گروهی از مولکول‌های زیستی هستند که از آمینواسیدها تشکیل شده‌اند. گروهی از پروتئین‌ها آنزیم هستند. آنزیم‌ها سرعت واکنش‌های شیمیایی را افزایش می‌دهند؛ در نتیجه می‌توان گفت مدت زمان انجام واکنش را کاهش می‌دهند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه (۱): پروتئین‌ها کارهای متفاوتی را در بدن انجام می‌دهند، مانند انقباض ماهیچه، انتقال مواد در خون و ... .

گزینه (۳): نوکلئیک اسیدها علاوه بر عناصر به کارفته در پروتئین‌ها، عنصر فسفر نیز دارند؛ بنابراین تنوع عناصر پروتئین‌ها از نوکلئیک اسیدها کم‌تر است.

گزینه (۴): مطابق شکل زیر در ساختار پروتئین‌ها ممکن است دو آمینواسید مشابه پشت سر هم قرار بگیرند.



۲



کدام مورد، در خصوص پزشکی شخصی صحیح است؟

۲

- ۱) روشی است که از قدیم برای تشخیص و درمان بیماری‌ها در حال گسترش بوده است.
- ۲) روشی است که با بررسی دنای فرد، تنها می‌تواند باعث شناسایی بیماری‌های ارثی فرد شود.
- ۳) روشی است که علاوه بر تشخیص بیماری، می‌تواند روش درمانی منحصر به فردی را ارائه نماید.
- ۴) روشی است که به جای بررسی وضعیت فرد، اطلاعات موجود در نوعی مولکول زیستی فسفردار او بررسی می‌شود.

زیرمبتد: فصل ۱- گفتار ۱- پزشکی شفهي

### پاسخ خیلی شریحی ✓

امروزه (نه از قدیم) پژوهشکان از روشی به نام پزشکی شخصی برای تشخیص و درمان بیماری‌ها استفاده می‌کنند (رد گزینه (۱)). پزشکی شخصی برای تشخیص و درمان بیماری‌ها (ارثی و غیرارثی) مورد استفاده قرار می‌گیرد (رد گزینه (۲)). در این شیوه روش‌های درمانی و دارویی خاص هر فرد است و براساس اطلاعات مولکول دنا (دارای عناصر N, H, O, C و P) تهیه می‌شود. در واقع درمان هر فرد منحصر به خود است (درستی گزینه (۳)). دقت کنید که در این روش، وضعیت ظاهری بیمار نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد (رد گزینه (۴)).

۳


با توجه به اطلاعات کتاب درسی، در خصوص لیپیدهای تولید شده در پایین ترین سطح حیات، کدام مورد صحیح است؟

کلسترون، فسفولیپید و  
تری‌گلیسرید

- ۱) هر کدام از آن‌ها که فاقد اسید چرب است، می‌تواند در ساختار چربی‌ها و روغن‌ها به کار رود.
- ۲) هر کدام از آن‌ها که در ساخت هورمون کاربرد دارد، در غشای یاخته‌سازنده نشاسته، غیر قابل مشاهده است.
- ۳) هر کدام از آن‌ها که دارای گلیسرول در بخشی کروی یا بیضی شکل است، گروه فسفات نیز دارد.
- ۴) هر کدام از آن‌ها که بیشترین تنوع عنصر را دارد، انرژی هر گرم آن حدود دو برابر هر گرم کربوهیدرات است.

#### زیرمبحث: فصل ۱-گفتار ۲- لیپیدها

کلسترون، فسفولیپید و تری‌گلیسرید سه نوع لیپید هستند که در کتاب درسی بیان شده‌اند.



از بین لیپیدهای مذکور، فقط کلسترون در تولید هورمون کاربرد دارد. کلسترون در ساختار غشای یاخته‌های جانوری یافت می‌شود و بنابراین در ساختار غشای یاخته‌های گیاهی وجود ندارد. نشاسته توسط یاخته‌های گیاهی تولید می‌شود.

در یاخته‌های زنده انواع مختلفی از لیپیدها وجود دارد؛ مثل تری‌گلیسرید، فسفولیپید و کلسترون. در غشای یاخته‌های جانوری کلسترون و فسفولیپید وجود دارد، اما خوب مثُن تری‌گلیسریدها در این غشا قرار نمی‌گیرند.



بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه (۱): روغن‌ها و چربی‌ها از انواع تری‌گلیسریدها هستند. تری‌گلیسرید حاوی اسید چرب است.

کلسترون، تنها لیپید مطرح شده در کتاب درسی است که اسید چرب ندارد.



گزینه (۳): گلیسرول هم در بخش کروی شکل فسفولیپید و هم در بخش بیضی شکل تری‌گلیسرید به کار رفته است. تری‌گلیسرید فاقد فسفات است.

گزینه (۴): کلسترون و تری‌گلیسرید، تنها ۳ عنصر (C, O, H) دارند، اما فسفولیپید علاوه بر این عناصر، عنصر فسفر نیز دارد؛ بنابراین قسمت اول این گزینه در مورد فسفولیپید است، ولی قسمت دوم در مورد تری‌گلیسرید می‌باشد.



جمعیت پروانه مونارک و تأثیر خورشید بر مهاجرت آنها، برای نخستین بار در سطح سازمان یابی حیات، به کمک کل نگری.

۶

سطح بومسازگان

بررسی می شود. در خصوص این سطح، چند مورد نادرست است؟

- الف) همه جانداران درون آن، هم گونه‌اند و در یک زمان و یک مکان زندگی می‌کنند.
- ب) دارای چندین اجتماع است و در تشکیل سطوح بالاتر از خود نیز شرکت می‌کند.
- ج) شامل بومسازگان‌هایی است که اقلیم و پراکنده‌گی جانداران آنها مشابه است.
- د) از قرارگیری تعدادی از آنها در کنار هم، بلافتله، بالاترین سطح حیات تشکیل می‌شود.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)



### زیرمبحث: فصل ۱-گفتار ۲ - سطوح سازمان یابی حیات

💡 Hint

پاسخ خیلی تشریحی ✓

بررسی تأثیر عوامل غیرزنده (مانند خورشید) بر جانداران، نخستین بار در سطح بومسازگان بررسی می‌شود.

بررسی همه موارد:

الف) در بومسازگان افراد متعلق به گونه‌های مختلف دیده می‌شوند که در مکان‌های مختلفی نیز زندگی می‌کنند.

ب) هر بومسازگان از تها (نه چندین) اجتماع تشکیل شده است. همه سطوح سازمان یابی حیات (از جمله بومسازگان)، در تشکیل سطوح بعدی نیز شرکت می‌کنند.

ج) این مورد مربوط به زیستبوم است، نه بومسازگان.

د) از کنار هم قرار گرفتن چند بومسازگان، ابتدا زیستبوم تشکیل می‌شود، نه زیستکره (بالاترین سطح حیات).

۵

در خصوص نوعی از مولکول‌های زیستی که اطلاعات و راثتی را در خود ذخیره می‌کند، کدام مورد یا موارد زیر را می‌توان بیان نمود؟

مولکول دنا

- الف) دو رشته به هم پیچیده و مجموعاً چهار نوع زیروحد دارد.
- ب) تنو عناصر اصلی سازنده آن، نسبت به فسفولیپیدها بیشتر است.
- ج) با بررسی اطلاعات این مولکول، می‌توان از بروز بیماری‌های ارثی پیشگیری کرد.
- د) به تازگی زیست‌شناسان توانسته‌اند با تغییر در محتوای آن، صفت جدیدی در جانداران ایجاد کنند.

(۱) ج - د

(۲) الف - ب - ج

(۳) الف - ب

**مشاوره** در درس زیست‌شناسی، به همه نکات نهفته در شکل‌های کتاب درسی، توجه ویژه داشته باشد.

### زیرمبث، فصل ۱-گفتار ۲- نوکلئیک اسیدها

### پاسخ خیلی تشریحی ✓

منظور صورت سؤال، مولکول دنا است.

بررسی همه موارد:

الف) مطابق شکل ۸ کتاب درسی، مولکول دنا دارای دو رشته مارپیچی و مجموعن چهار نوع زیروحد (مونومر) است.

تفاوت نوکلئوتیدهای به کاررفته در دنا از یکدیگر، در بازهای آلی آن‌ها است. همه نوکلئوتیدهای به کاررفته در دنا، سه بخش مشخص دارند: (۱) قند (دئوكسی‌ریبوز)، (۲) فسفات (یک عدد)، (۳) باز آلی (A, T, C, G) بازهای آلی هستند که هر نوکلئوتید به کاررفته در دنا، یکی از آن‌ها را دارد.) (زیست دوازدهم- فصل ۱)

ب) نوکلئیک اسیدها دارای عناصر کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و فسفر هستند، در حالی که فسفولیپیدها نیتروژن ندارند؛ در نتیجه نوکلئیک اسیدها نسبت به فسفولیپیدها عناصر متنوع‌تری دارند.

به طور کلی، نوکلئیک اسیدها متنوع‌ترین عناصر در میان مولکول‌های زیستی هستند.

ج) با توجه به اطلاعات دنا می‌توان فهمید که فرد می‌تواند به چه بیماری‌های ارثی مبتلا شود؛ در نتیجه می‌توان از بروز این بیماری‌ها جلوگیری کرد.

د) مدت‌هاست (نه به تازگی!) که زیست‌شناسان می‌توانند با استفاده از مهندسی ژنتیک در جانداران تغییر ایجاد کنند. در این فرایند، با تغییر در محتوای دنای جانداران، صفت جدید در آن‌ها ایجاد می‌شود.

اطلاعات دنا، تعیین‌کننده صفت‌ها هستند، پس اگر این اطلاعات تغییر کنند، صفت‌ها هم ممکن است تغییر کنند.





چند مورد از عبارت‌های زیر درباره علوم تجربی و شاخه‌های آن، نادرست است؟

۶

الف) همه شاخه‌های آن، به بررسی علمی جانداران و فرایندهای زیستی می‌پردازند.

ب) محققین این علوم، فقط در جست‌وجوی علت(های) پدیده‌های طبیعی و قابل مشاهده هستند.

ج) فقط در شاخه بررسی کننده حیات، ساختارها و فرایندهای قابل مشاهده و اندازه‌گیری بررسی می‌شوند.

د) محققان هیچ شاخه‌ای از آن، درباره ارزش‌های هنری یا زشتی و زیبایی پدیده‌های زیستی نظر نمی‌دهند.

۴) ۴

۱) ۳

۲) ۲

۳) ۱

زیرمبحث، فصل ۱- گفتار ۱- محدوده علم زیست‌شناسی

پاسخ خیلی تشریحی ✓ موارد «الف» و «ج» نادرست هستند.

بررسی همه موارد:

الف) از بین شاخه‌های علوم تجربی فقط شاخه زیست‌شناسی به بررسی علمی جانداران و فرایندهای زیستی می‌پردازد.

ب) پژوهشگران علوم تجربی فقط در جست‌وجوی علت‌های پدیده‌های طبیعی و قابل مشاهده هستند.

ج) در زیست‌شناسی (علم بررسی حیات) مثل هر شاخه دیگر علم تجربی، فقط ساختارها و پدیده‌هایی بررسی می‌شوند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم قابل مشاهده و اندازه‌گیری می‌باشند.

د) پژوهشگران علوم تجربی نمی‌توانند درباره زشتی و زیبایی، خوبی و بدی، ارزش‌های هنری و ادبی نظر بدهند.

۷



طبق اطلاعات کتاب درسی، نوعی جانور بی‌مهره به کمک گروهی از یاخته‌های عصبی بدن خود، مسیر مکزیک به جنوب کانادا و بالعکس



آن را جهت یابی می‌کند. کدام مورد، در ارتباط با این جانوران به نادرستی بیان شده است؟

پروانه‌مونارک

- (۱) در شب‌ها و همچنین در هوای ابری، ممکن است جهت یابی آن‌ها مختل شود.
- (۲) به کمک نورون‌هایی، جایگاه خورشید را تشخیص و همواره به سمت آن پرواز می‌کنند.
- (۳) بال‌های زرد یا نارنجی دارند و بخشی از زندگی خود را روی درختان سپری می‌کنند.
- (۴) جمعیت آن‌ها برای انجام یکی از شگفت‌انگیزترین مهاجرت‌ها، هر ساله هزاران کیلومتر را می‌پیمایند.

#### زیرمبحث: فصل ۱- مقدمه فصل - پروانه مونارک

پاسخ خیلی تشریحی ✓

منظور صورت سؤال، پروانه مونارک است.

این پروانه‌ها به کمک یاخته‌های عصبی (نورون‌هایی) در بدن خود، جایگاه خورشید را تشخیص می‌دهند و به سمت مقصد (نه به سمت خورشید) پرواز می‌کنند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه (۱): در زمانی که خورشید در آسمان نباشد (شب) یا قابل مشاهده نباشد (هوای ابری)، جهت یابی و بنابراین انجام مهاجرت برای پروانه‌های مونارک مختل می‌شود.

گزینه (۳): طبق شکل کتاب درسی در مقدمه فصل اول، بال پروانه‌های مونارک زرد یا نارنجی رنگ است و این پروانه‌ها ممکن است بر روی درختان دیده شوند.

گزینه (۴): طبق متن کتاب، جمعیت این پروانه‌ها (نه کدام از آن‌ها) با انجام یکی از شگفت‌انگیزترین مهاجرت‌ها، هر سال هزاران کیلومتر را از مکزیک تا جنوب کانادا و بالعکس می‌پیماید.

چندین نسل طول می‌کشد تا مهاجرت این پروانه‌ها تکمیل شود و یک پروانه نمی‌تواند یک‌تنه! کل مسیر را طی کند.

نکته



مطلوب با مطلب کتاب درسی، در ارتباط با ویژگی هایی که امروزه زیست شناسی را به رشته ای متوجه، توانا، پویا و امید بخش تبدیل کرده اند.

کدام مورد به درستی بیان شده است؟

کل نگری، نگرش بین رشته ای، فناوری های نوین و اخلاق زیستی

- ۱) در اخلاق زیستی، موارد مربوط به محروم بودن اطلاعات پژوهشکار افراد برخلاف تولید هر نوع دارو، بررسی می گردد.
- ۲) استفاده از دانش آمار و فنون مهندسی برای شناخت بیشتر سامانه های زندگی، مربوط به فناوری های نوین زیستی است.
- ۳) ساخت حافظه دو ترا بایتی و ایجاد امکان انجام محاسبات در سریع ترین زمان، از تحولات ایجاد شده در بیست سال اخیر است.
- ۴) ایجاد امکان انتقال صفت یک جاندار به جاندار دیگر و تحلیل و با ایگانی اطلاعات، تنها از دستاوردهای نگرش بین رشته ای است.

#### زیربند: فصل ۱- گفتار ۱- زیست شناسی نوین

#### پاسخ خیلی تشریحی ✓


منظور صورت سؤال، کل نگری، نگرش بین رشته ای، فناوری های نوین و اخلاق زیستی است.

دستاوردها و تحولات بیست ساله اخیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در پیشرفت زیست شناسی، تأثیر بسیاری داشته است. این فناوری ها امکان انجام محاسبات را در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم کرده اند. ساخت حافظه های دو ترا بایتی نیز از جمله این تحولات است. بررسی سایر گزینه ها:

- گزینه (۱): موارد مربوط به محروم بودن اطلاعات ژئو و نیز اطلاعات پژوهشکار افراد و حقوق جانوران از موضوع های اخلاق زیستی هستند؛ همچنین تولید سلاح زیستی نیز در این حیطه بررسی می شود. سلاح زیستی می تواند عامل بیماری زایی باشد که نسبت به داروهای رایج مقاوم است یا فراورده های غذایی و دارویی با عواقب زیانی برای افراد باشند.
- گزینه (۲): این موارد مربوط به نگرش بین رشته ای هستند، نه فناوری های نوین.
- گزینه (۴): انتقال صفات بین جانداران (مهندسی ژنتیک) و تحلیل و با ایگانی داده ها (فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی) مربوط به فناوری های نوین هستند، نه نگرش بین رشته ای.

شکل زیر سطوح سازمان یابی حیات را نشان می‌دهد. با توجه به این شکل، کدام مورد به درستی بیان شده است؟

۹



- (۱) همه افراد هم گونه، در سطح (۲) کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.
- (۲) سطوح (۳) با اقلیم متفاوت، تنها در سطح (۵) کنار هم قرار می‌گیرند.
- (۳) تنها در سطح (۴)، تعامل بین گونه‌های مختلف قابل بررسی است.
- (۴) در هر موجود زنده، سطح (۱)، همه ویژگی‌های حیات را بروز می‌دهد.

### زیرمبحث: فصل ۱-گفتار ۲- سطوح سازمان یابی حیات

بومسازگان‌هایی با اقلیم مشابه، در سطح زیست‌بوم در کنار هم قرار می‌گیرند. در سطح زیست‌کرہ، همه زیست‌بوم‌ها و بنابراین بوم‌سازگان‌هایی با اقلیم متفاوت دیده می‌شوند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

- گزینه (۱): افراد هم گونه‌ای که در یک زمان و یک مکان زندگی می‌کنند، در سطح جمعیت کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. در واقع صرفاً هم گونه‌بودن افراد، باعث قرارگیری آن‌ها در یک جمعیت نمی‌شود.
- گزینه (۳): در سطح اجتماع به بعد، تعامل بین جانداران گونه‌های مختلف قابل بررسی است.

**همه مواردی که در یک سطح حیات دیده می‌شوند، در همه سطوح بعد از آن نیز قابل مشاهده‌اند.**

### پاسخ خیلی تشریحی ✓

گزینه (۴): همه ویژگی‌های حیات، در جانداران بروز داده می‌شود. با توجه به این موضوع، در تک‌یاخته‌ای‌ها، همه ویژگی‌های حیات در همان سطح یاخته بروز داده می‌شود (زیرا در این جانداران هر یاخته، خودش یک جاندار مستقل محسوب می‌شود؛ اما در پریاخته‌ای‌ها، همه ویژگی‌های حیات در سطح پنجم (فرد) بروز می‌یابد، نه در سطح یاخته! مثلث آیا یک یاخته عصبی در انسان، توانایی تولیدمثل و ایجاد انسانی جدید را دارد؟!)

### نکته



کدام عبارت، در ارتباط با زیست‌شناسان صحیح است؟

۱۰

- (۱) قطع درختان جنگل‌ها برای استفاده از زمین را از عوامل وقوع سیل، فرسایش خاک و افزایش تنوع زیستی می‌دانند.
- (۲) برای افزایش محصول گیاهان، تنها شناخت تعاملات سودمند گیاهان با عوامل زنده و غیرزنده را مؤثر می‌دانند.
- (۳) دریافته‌اند، پیکر جانداران تک‌یاخته‌ای اجزای اندکی دارد و کل آن، چیزی بیش از مجموع اجزای آن است.
- (۴) معتقدند، با پایدار کردن بوم‌سازگان‌ها، هم‌چنان احتمال کاهش میزان خدمات آن با تغییر اقلیم وجود دارد.

**مشاوره** برای پاسخ‌گویی به سوالات آزمون‌ها و کنکور سراسری، نیاز به تسلط کامل به متن کتاب درسی دارید. تک‌تک جملات و کلمات درسی و خصوصی کلماتی از جمله قیدها (مثل همه، بعضی از و ...) حائز اهمیت هستند.

#### زیرمبحث: فصل ۱- گفتار ۱- زیست‌شناسی در فرمت انسان

#### پاسخ خیلی شریحی ✓

میزان خدمات هر بوم‌سازگان به میزان تولیدکنندگان آن بستگی دارد. پایدار کردن بوم‌سازگان‌ها به طوری که حتی در بوم‌سازگان پایدار شده، در صورت تغییر اقلیم، تغییر چندانی در مقدار تولیدکنندگی آن‌ها روی ندهد، موجب ارتقای کیفیت زندگی انسان می‌شود. لذا ممکن است تغییر اقلیم، تا حدی سبب کاهش میزان تولیدکنندگی و در بی آن کاهش میزان خدمات بوم‌سازگان شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه (۱): نابودی جنگل‌ها از عوامل تغییرات آب‌وهوا، سیل، کاهش تنوع زیستی و افزایش فرسایش خاک است.

گزینه (۲): گیاهان مانند همه جانداران دیگر در محیطی پیچیده، شامل عوامل غیرزنده مانند دما، رطوبت، نور و عوامل زنده شامل باکتری‌ها، قارچ‌ها، حشرات و مانند آن‌ها رشد می‌کنند و محصول می‌دهند؛ بنابراین شناخت بیشتر تعامل‌های سودمند یا زیانمند بین این عوامل و گیاهان، به افزایش محصول کمک می‌کند.

گزینه (۳): طبق متن کتاب درسی، پیکر هر یک از جانداران از اجزای بسیاری تشکیل شده است.

پیکر تک‌یاخته‌ای‌ها نیز مانند پریاخته‌ای‌ها، اجزای زیادی دارد، مثلاً اندامک‌ها، مولکول‌های زیستی مختلف و ... .

**نکته**

در خصوص نیاز مردم جهان به انرژی و تأمین آن، کدام مورد از نظر درستی با نادرستی، با سایر گزینه‌ها متفاوت است؟

- (۱) بخش عده‌انرژی در جهان کنونی، از منابع تجدیدناپذیر مانند بنزین، نفت و گاز تأمین می‌شود.
- (۲) استفاده از پسماند مزارع نیشکر، مثالی از تلاش انسان برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی است.
- (۳) تغییرات آب‌وهوازی، پیامد مشترک افزایش مصرف سوخت‌های زیستی و از بین رفتن جنگل‌ها است.
- (۴) وجه شبات و تفاوت نفت با دانه‌های روغنی، به ترتیب، داشتن منشأ زیستی و قابلیت تجدیدپذیری است.

۱۱

**مشاوره** این سبک سؤال، سبکی جدید است. در این مدل سؤالات باید ابتدا درستی و نادرستی همه گزینه‌ها را تعیین نمایید و سپس گزینه‌ای که از این نظر متفاوت است، به عنوان پاسخ انتخاب کنید.

### زیرمبتد، فصل ا-گفتار ۱- زیست‌شناسی در فرمت انسان

گزینه (۳) نادرست و سایر گزینه‌ها درست هستند.

دقت کنید که تغییرات آب‌وهوازی، پیامد مشترک افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی (نه زیستی) است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه (۱): بیشترین نیاز کنونی جهان به انرژی از منابع فسیلی (تجددناپذیر)، مانند نفت، گاز و بنزین تأمین می‌شود.

گزینه (۲): طبق متن فعالیت ۳، این مورد درست است.

گزینه (۴): تفاوت سوخت‌های فسیلی (نفت و گاز) با سوخت‌های زیستی (مثل دانه‌های روغنی) در این است که سوخت‌های برخلاف فسیلی، تجدیدپذیرند. شباهت هر دو نوع سوخت هم این است که منشأ زیستی دارند.

دقت کنید که سوخت‌های فسیلی همانند سوخت‌های زیستی منشأ زیستی دارند و از تجزیه پیکر جانداران به وجود می‌آیند؛ سوخت‌های زیستی از جانداران امروزی به دست می‌آیند ولی سوخت‌های فسیلی از جاندارانی که در گذشته زندگی می‌کردند، حاصل شده‌اند.

**پاسخ خوبی تشریحی** ✓

**نکته** 🔍



۱۲

براساس اطلاعات کتاب درسی، کدام عبارت در ارتباط با شاخه‌ای از علوم تجربی که به بررسی علمی جانداران و فرایندهای زیستی می‌پردازد، صحیح است؟

زیست‌شناسی

- ۱) فقط بعضی از پژوهش‌های انجام‌گرفته در این شاخه، جهت حل مشکلات و مسائل بشر بوده است.
- ۲) به کمک آن، با انتقال پروتئین‌های تار عنکبوت به بزها، شیر حاوی این پروتئین تولید می‌شود.
- ۳) امروزه دانشمندان این رشتہ تعریفی کامل و جامع از حیات ارائه داده‌اند و ویژگی‌های آن را ذکر کرده‌اند.
- ۴) با پیشرفت‌های آن، بیماری‌های مثل قند، به علت روش‌های تشخیصی جدید، دیگر مرگ آور نیستند.

## زیربند: فعلی - گفتار - دانش زیست‌شناسی

## پاسخ خیلی تشریحی ✓

منظور صورت سؤال، دانش زیست‌شناسی است. مطابق متن کتاب درسی، بخشی از پژوهش‌های زیست‌شناسان به منظور پی‌بردن به رازهای آفرینش است و بخشی دیگر، برای حل مسائل و مشکلات بشر انجام می‌شود.  
بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه (۲): امروزه در مهندسی ژنتیک، با انتقال نوعی ژن (نه پروتئین) به بزها، امکان تولید پروتئین‌های تار عنکبوت در شیر آن‌ها فراهم شده است.  
گزینه (۳): تعریف حیات بسیار دشوار است و شاید حتی غیرممکن باشد. در علم زیست‌شناسی به جای تعریف حیات، ویژگی‌های آن و یا ویژگی‌های جانداران را بررسی می‌کنیم.  
گزینه (۴): امروزه بسیاری از بیماری‌ها مانند بیماری قند و افزایش فشار خون که حدود صد سال پیش به مرگ منجر می‌شدند، مهار شده‌اند و به علت روش‌های درمانی و داروهای جدید، دیگر مرگ آور نیستند.

۱۳

کدام مورد، در ارتباط با همه جانداران، صادق است؟

۱۳

- (۱) در پیکر خود، سطوحی از سازمان یابی دارند و منظم‌اند.
- (۲) ویژگی‌هایی برای ماندگاری در محیط زندگی خود دارند.
- (۳) می‌توانند با افزایش برگشت‌پذیر تعداد یاخته‌ها، رشد کنند.
- (۴) با دفع ادرار، وضع درونی خود را در محدوده ثابتی حفظ می‌کنند.

**زیرمبتد، فصل ۱-گفتار ۲-ویژگی‌های چانداران**

**پاسخ خیلی تشریحی ✓**

همه جانداران، ویژگی سازش با محیط را بروز می‌دهند. این ویژگی باعث می‌شود جمعیتی از جانداران با محیطی که در آن زندگی می‌کنند، متناسب و در آن ماندگار باشند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه (۱): تک یاخته‌ای‌ها در پیکر خود فقط سطح اول را دارند و بنابراین لفظ «سطوح» نادرست است.

گزینه (۳): تک یاخته‌ای‌ها با تقسیم یاخته‌ای، تولیدمثل می‌کنند، نه رشد! این جانداران به کمک افزایش ابعاد آن‌ها صورت می‌گیرد.

افزایش برگشت‌پذیر ابعاد یاخته‌ها از جمله افزایش ابعاد یاخته‌های چربی و یا تورسانس یاخته‌های گیاهی (فصل ۶ زیست دهم)، رشد محسوب نمی‌شود.

گزینه (۴): دفع ادرار مختص پریاخته‌ای‌هاست! کل یاخته‌ای ادرارش کجا بود؟!

**نکته**

۱۴



طبق مطلب کتاب درسی، نوعی دی‌ساکارید در جوانه گندم و جو وجود دارد. کدام گزینه مشخصه این مولکول زیستی محسوب نمی‌شود؟

۱۴

مالتوز

- (۱) در ساختار خود دارای دو حلقه شش‌ضلعی یکسان و متصل به هم است.
- (۲) با پلی‌ساکارید مورد استفاده برای تولید پارچه، در زیرواحدهای سازنده شباهت دارد.
- (۳) همانند پلی‌ساکارید ذخیره‌ای جانوران و قارچ‌ها، تنها یک نوع منوساکارید دارد.
- (۴) با همهٔ لیپیدهای موجود در یک یاختهٔ جانوری، عناصری کاملاً یکسان با نسبت متفاوت دارد.

زیرمبتد: فصل ۱- گفتار ۲- کربوهیدرات‌ها

### پاسخ خیلی شریحی ✓

مالتوز دی‌ساکاریدی است که از اتصال دو مولکول گلوکز به یکدیگر تشکیل شده است. فسفولیپید برخلاف مالتوز حاوی عنصر فسفر است. پس نمی‌توان گفت که عناصر همهٔ لیپیدها با عناصر مالتوز کاملاً یکسان است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه (۱): مالتوز دارای دو گلوکز متصل به هم می‌باشد و هر مولکول گلوکز از یک حلقه شش‌ضلعی ساخته شده است.

گزینه (۲): سلولز در تولید پارچه به کار می‌رود؛ سلولز و مالتوز هر دو از مولکول‌های گلوکز تشکیل شده‌اند.

گزینه (۳): مالتوز و گلیکوزن (پلی‌ساکارید ذخیره‌ای جانوران و قارچ‌ها)، فقط از گلوکز (یک نوع منوساکارید) ساخته شده‌اند.

**نکته** تنواع زیرواحدهای سلولز، گلیکوزن و ناشاسته، با مالتوز یکسان است (همگی فقط گلوکز دارند)، اما تعداد زیرواحدهای مالتوز از پلی‌ساکاریدهای ذکر شده کمتر می‌باشد.

۱۵

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«سطحی از سازمان یابی حیات که در آن، برای نخستین بار .....، از سطح ..... پایین‌تر است.»

۱) عوامل زنده و غیرزنده روی یکدیگر تأثیر می‌گذارند - هفتم

۲) عوامل بین چند بافت مشاهده می‌شود - سوم

۳) چندین گونه جانداران وجود دارند - هشتم

### زیرمبینت، فصل اُغفار ۲ - سطوح سازمان یابی حیات

### پاسخ خیلی تشریحی ✓

اجتماع (سطح هفت) نخستین سطحی است که از چندین گونه جانداران تشکیل شده است. این سطح پایین‌تر از سطح هشت می‌باشد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه (۱): بومسازگان (سطح هشت) نخستین سطحی است که عوامل زنده و غیرزنده روی یکدیگر تأثیر می‌گذارند. این سطح بالاتر از سطح هفت است.

گزینه (۲): تعامل بین چند بافت برای نخستین بار در اندام (سطح سوم) مشاهده می‌شود. سطح سوم از سطح سوم پایین‌تر نیست!!

گزینه (۴): زیست بوم (سطح نهم) نخستین سطحی است که از چند بومسازگان تشکیل شده است.

نام سطح	اجزا	نکات مربوطه
یاخته	در پروکاریوت‌ها: غشا + سیتوپلاسم و محتويات آن (مثل دنا و رناتن)	در همه جانداران وجود دارد. پایین‌ترین سطح سازمان یابی حیات است.
بافت	تعدادی یاخته که لزوماً هم‌شکل نیستند (البته می‌توانند هم‌شکل هم باشند).	این سطح فقط در پریاخته‌ای‌ها وجود دارد. در انسان ۴ نوع بافت اصلی (پوششی، عصبی، ماهیچه‌ای و پیوندی) و در گیاهان آوندی ۳ سامانه بافتی (زمینه‌ای، پوششی و آوندی) وجود دارد.
اندام	تعدادی بافت	استخوان به عنوان یک اندام می‌تواند دارای بافت‌های پوششی، پیوندی و عصبی باشد. همه بافت‌هایه مقادیر متفاوت در اندام‌ها مشاهده می‌شوند.
دستگاه	تعدادی اندام	مثلث دستگاه حرکتی انسان شامل ماهیچه‌های اسکلتی و استخوان‌ها است.
جاندار (فرد)	یاخته (در تک یاخته‌ای‌ها خود یاخته، یک فرد است). / دستگاه‌ها (در پریاخته‌ای‌ها)	یک جاندار، فردی از جمعیت است.
جمعیت	افراد یک گونه که در یک مکان و زمان خاص با هم زندگی می‌کنند.	گونه به گروهی از جانداران می‌گویند که می‌توانند از طریق تولید مثال زاده‌هایی شبیه خود با قابلیت زنده‌ماندن و تولید مثال به وجود آورند.
اجتماع	چند جمعیت که در تعامل با هم هستند.	افراد درون یک اجتماع می‌توانند هم‌گونه یا غیر هم‌گونه باشند.
بومسازگان	عوامل زنده (اجتماع) + عوامل غیرزنده محیط + تأثیر این عوامل بر یکدیگر	اولین سطحی است که در آن عوامل غیرزنده محیط هم در نظر گرفته می‌شوند. در یک بومسازگان چند گونه وجود دارد.
زیست بوم	چند بومسازگان	بومسازگان‌های تشکیل دهنده یک زیست بوم از نظر اقلیم (آب و هوای) و پراکندگی جانداران مشابه‌اند.
زیست کره	همه زیست بوم‌های زمین	در حال حاضر، فقط یک زیست کره وجود دارد.



در ارتباط با «اخلاق زیستی»، کدام عبارت صحیح است؟

۱۶

- (۱) نگرش بین رشته‌ای برخلاف اخلاق زیستی، از ویژگی‌های زیست‌شناسی نوین است.
- (۲) فقط مسائل مربوط به محروم‌بودن اطلاعات افراد و سلاح‌های زیستی در آن بررسی می‌شوند.
- (۳) تولید باکتری‌های مقاوم به پادزیست (آنٹی‌بیوتیک) را ناپسند و نوعی سلاح زیستی می‌داند.
- (۴) پیشرفت سریع زیست‌شناسی تنها در زمینه مهندسی ژنتیک، زمینه سوء استفاده‌هایی را فراهم کرده است.

زیرمبتد: فصل ۱- گفتار ۱- اخلاق زیستی

### پاسخ خیلی شریحی ✓

تولید جانداران مقاوم به داروهای رایج (مثلن تولید باکتری‌های مقاوم به پادزیست)، مربوط به تولید سلاح‌های زیستی است که برای عدم تولید آن، براساس اخلاق زیستی، قوانینی وضع شده است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه (۱): اخلاق زیستی نیز از ویژگی‌های زیست‌شناسی نوین است.

گزینه (۲): علاوه بر این موارد، طبق متن کتاب درسی، حقوق جانوران نیز در این حیطه بررسی می‌شود.

گزینه (۴): پیشرفت‌های سریع علم زیست‌شناسی، به ویژه (نه فقط!) در مهندسی ژنتیک، زمینه سوء استفاده‌هایی را در جامعه فراهم کرده است.

۱۷



براساس متن کتاب درسی، در ارتباط با شکل مقابل، کدام عبارت صحیح است؟ دریاچه‌ارومیه

۱۷

- ۱) در سطوح سازمان یابی حیات، یک سطح پایین‌تر از زیست کره قرار می‌گیرد.
- ۲) محققان، سدسازی نامناسب و احداث بزرگ‌راه را از دلایل خشک‌شدن کامل آن می‌دانند.
- ۳) میزان منابع و سودهایی که در بر دارد، به میزان تولید کنندگان آن وابسته است.
- ۴) زیست‌شناسان کشورمان امیدوارند که بتوانند در آینده، برای نخستین بار راهکارهایی برای احیای آن، ارائه نمایند.

#### زیرمبتد، فصل ا-گفتار ا-حافظت از بوم‌سازگان‌ها، ترمیم و بازسازی آن‌ها

#### پاسخ خیلی تشریحی ✓

شكل نشان‌دهنده دریاچه ارومیه است که یکی از بوم‌سازگان‌های آسیب‌دیده ایران است. به طور کلی منابع و سودهایی را که هر بوم‌سازگان در بر دارد، خدمات بوم‌سازگان می‌نامند. میزان خدمات هر بوم‌سازگان به میزان تولید کنندگان آن بستگی دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

- گزینه (۱): بوم‌سازگان (سطح هشتم حیات)، دو سطح پایین‌تر از زیست کره (سطح دهم حیات) قرار دارد.
- گزینه (۲): دقت کنید که این دریاچه هنوز خشک نشده است، بلکه طبق متن کتاب، دریاچه ارومیه چندین سال است که در خطر خشک‌شدن قرار گرفته است.
- گزینه (۴): طبق متن کتاب درسی، زیست‌شناسان کشورمان با استفاده از اصول علمی بازسازی بوم‌سازگان‌ها، همین حالا هم راهکارهای لازم را برای احیای آن ارائه کرده‌اند.

۱۸



با توجه به مطلب کتاب درسی، چند مورد از موارد زیر، از جمله اهداف زیست‌شناسان جهت حل مسائل و مشکلات زندگی انسان امروزی است؟

۱۸

- الف) سوخت‌های زیستی را جایگزین سوخت‌های فسیلی از جمله الکل کنند.
- ب) نحوه جهت‌یابی جمعیت پروانه مونارک برای انجام مهاجرت را کشف نمایند.
- ج) یاخته‌های سرطانی را در مراحل اولیه سرطانی شدن، شناسایی و نابود کنند.
- د) از بروز بیماری‌های ارشی، پیشگیری کنند و در صورت بروز، آن‌ها را درمان نمایند.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۲ (۲)

**زیرمبحث: فصل ۱-گفتار ۱- زیست‌شناسی چیست؟**

**پاسخ خیلی تشریحی ✓**

موارد «ج» و «د» درست هستند.

در صفحه ۲ کتاب درسی، نمونه‌ای از پرسش‌هایی ذکر شده است که زیست‌شناسان تلاش می‌کنند پاسخ‌های آن‌ها را بیابند تا علاوه بر پی‌بردن به رازهای آفرینش، به حل مسائل و مشکلات زندگی انسان امروزی نیز کمک کنند و در این راه به موفقیت‌هایی هم رسیده‌اند. موارد «ج» و «د» جزء موارد مطرح شده در این موضوع هستند، اما دقت کنید که فهمیدن نحوه جهت‌یابی پروانه مونارک «مورد ب»، ارتباطی به حل مسائل و مشکلات زندگی انسان ندارد! هم‌چنین در خصوص مورد «الف» دقت کنید که طبق متن کتاب درسی، الکل، خودش نوعی سوخت زیستی است، نه سوخت فسیلی.

۱۹



کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر، مناسب است؟

«همه جانداران، می‌توانند در سراسر طول عمر خود، .....»

۱) تنها از بخشی از انرژی مواد غذایی، استفاده نمایند

۲) توسط نورون‌های خود، اثر محرک را دریافت و به آن پاسخ دهند

۳) با انجام تولیدمثل، موجوداتی کم‌وبیش شیوه خود را ایجاد کنند

۴) با حفظ همایستایی، وضعیت یاخته‌های خود را پایدار نگه دارند

### زیرمبتد، فصل ۱- گفتار ۲- ویرگی‌های پانداران

### پاسخ خلیلی تشریحی ✓

همه جانداران، تنها از بخشی از انرژی مواد غذایی استفاده می‌کنند، زیرا بخشی از انرژی غذا به صورت گرما از دست می‌رود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه (۲): تک‌یاخته‌ای‌ها قادر یاخته عصبی (نورون) هستند.

گزینه (۳): دقت کنید که جانداران نابالغ توانایی تولیدمثل ندارند، بنابراین نمی‌توان گفت هر فردی در تمام طول عمر خود توانایی تولیدمثل دارد.

در ارتباط با تولیدمثل به نکات زیر توجه نمایید:

۱) زنبور عسل ماده کارگر، جانداری نازا است (توانایی تولیدمثل ندارد).

۲) جانداران نابالغ، توانایی تولیدمثل ندارند.

۳) جاندارانی که تولیدمثل غیرجنسی می‌کنند، زاده‌ای کاملن یکسان (نه کم‌وبیش مشابه) با خود ایجاد می‌کنند.

گزینه (۴): تک‌یاخته‌ای‌ها فقط یک یاخته دارند و استفاده از لفظ «یاخته‌ها» برای آن‌ها، نادرست است.





## جانداران (عوامل زنده)

چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ ۲۰

- «گروهی از عواملی که در زیست کرده قابل مشاهده‌اند، در ساختار خود علاوه بر مولکول‌های زیستی، محتوی مولکول‌های غیرزیستی نیز هستند. هر ویژگی مشترک بین آن‌ها که .....، به طور حتم .....».
- (الف) شامل عبور از یک مرحله به مرحله دیگر زندگی است - به معنی بزرگ شدن و افزایش برگشت‌ناپذیر ابعاد و تعداد یاخته‌ها است
- (ب) نشان‌دهنده نظم و ترتیب در آن‌ها می‌باشد - شامل حداقل هفت سطح مشترک در میان تمام این عوامل در زیست کرده است
- (ج) تأثیر عوامل غیرزنده محیطی در روز آن نقش دارد - تنها شامل پاسخ به این عوامل و بروز سازگاری در برابر آن‌ها است
- (د) اختلال در آن، سایر ویژگی‌ها را نیز مختل می‌کند - شامل مجموعه اعمالی است که سبب پایداربودن وضع درونی جاندار می‌شود

۴ (۴)

۳ (۳)

۱ (۲)

۱) صفر

## زیرمبتد: فصل ۱- گفتار ۲- ویژگی‌های جانداران

## پاسخ خیلی شریحی ✓

تنها مورد «ب» صحیح است.

در زیست کرده علاوه عوامل غیرزنده، جانداران نیز قابل مشاهده‌اند که توانایی ساخت مولکول‌های زیستی را دارند؛ همچنین جانداران می‌توانند درون پیکر خود مولکول‌های غیرزیستی مثل یون‌ها را نیز داشته باشند. همه موجودات دارای هفت ویژگی مشترک می‌باشند. بررسی همه موارد:

- (الف) نمو در جانداران با عبور از یک مرحله به مرحله دیگر حیات انجام می‌شود. رشد در جانداران به معنی بزرگ شدن و شامل افزایش ابعاد یا تعداد یاخته‌ها به صورت برگشت‌ناپذیر است.
- (ب) نظم و ترتیب باعث می‌شود همه جانداران سطحی از سازمان یابی حیات باشند. توجه کنید سطوح سازمان یابی مربوط به همه جانداران چه پریاخته‌ای و چه تکیاخته‌ای، حداقل شامل سطوح یاخته، فرد، جمعیت، اجتماع، یوم‌سازگان، زیست‌بوم و زیست کرده است. تکیاخته‌ای‌ها قادر سطوح بافت، اندام و دستگاه می‌باشند.

در جانداران تکیاخته‌ای که بافت، اندام و ... ندارند، یاخته‌ها می‌توانند با هم تعامل داشته باشند، البته این تعاملات به معنی تشکیل بافت نیست، بلکه نشان‌دهنده وجود تعاملات و ارتباطات بین افراد یک جمعیت است.

- (ج) ویژگی‌های گوناگونی مثل جذب و استفاده از انرژی و یا حتی هومئوستازی (طبق متن کتاب هومئوستازی سبب می‌شود وضع درونی پیکر جاندار با توجه به تغییرات محیط همچنان در محدوده ثابتی بماند!) نیز می‌توانند تحت تأثیر محیط قرار گیرند.
- (د) علاوه بر هومئوستازی، جذب و استفاده از انرژی نیز می‌تواند در فرایندهای مختلف یاخته‌ای تأثیر داشته باشد! زیرا بسیاری از فرایندهای یاخته‌ای به انرژی نیاز دارند.

## نکته

در گروهی از جانداران، از قرار گرفتن تعدادی یاخته در کنار یکدیگر، ابتدا ششمین سطح حیات ایجاد می‌شود. در خصوص این جانداران.

۲۱

کدام عبارت زیر صحیح است؟

تکیاختهایها

- (۱) می‌توانند با تولید گامت، جاندارانی که ویش مشابه خود ایجاد کنند.
- (۲) برای حفظ هم‌ایستایی، غلظت مایع بین یاخته‌ای خود را در محدوده‌ای ثابت نگه می‌دارند.
- (۳) بخشی از انرژی حاصل از غذای هضم شده در دستگاه گوارش آن‌ها، به صورت گرمایی از دست می‌رود.
- (۴) یک سامانه زیستی محسوب می‌شوند که نمی‌توان آن را فقط از طریق مطالعه اجزای سازنده آن توضیح داد.



مشاوره همیشه در سوالات مربوط به سطوح سازمان یابی حیات، حواس‌تان به تفاوت‌های جانداران تکیاختهای و پریاختهای باشد.

### زیرمبتد، فصل اول- گفتار ۲- سطوح سازمان یابی حیات

منظور صورت سؤال، تکیاختهای‌ها است. در پریاختهای‌ها از کنار هم قرار گرفتن چند یاخته، ابتدا سطح دوم (بافت) ایجاد می‌شود، اما

Hint

در تکیاختهای‌ها هر یاخته یک فرد است و با کنار هم قرار گرفتن چند یاخته، ابتدا سطح جمعیت (ششم) ایجاد می‌شود.

جانداران را نوعی سامانه می‌دانند که اجزای آن با هم ارتباط دارند؛ به همین علت ویژگی‌های سامانه را نمی‌توان فقط از طریق مطالعه اجزای سازنده آن توضیح داد و ارتباط بین اجزا نیز مانند خود اجزا در تشکیل جاندار، مؤثر و کل سامانه، چیزی بیشتر از مجموع اجزای آن است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه (۱): تولید گامت، مختص پریاختهای‌ها است. تکیاختهای‌ها توانایی تولید گامت ندارند و با انجام تقسیم، مستقیم‌تر تولید می‌کنند.

پاسخ خوبی تشریحی ✓

گزینه (۲): تکیاختهای‌ها مایع بین یاخته‌ای ندارند. این مایع بین یاخته‌های پریاختهای‌ها وجود دارد.

گزینه (۳): تکیاختهای‌ها دستگاه ندارند!


۲۲

## کدام عبارت در ارتباط با سطوح سازمان یابی حیات، نادرست است؟

۲۲

- (۱) در ششمین سطح برخلاف هفتمین سطح، همه جانداران موجود در یک مکان مشترک، هم گونه هستند.
- (۲) در نهمین سطح برعکس هشتمین سطح، انواعی از اجتماعات مربوط به موجودات زنده وجود دارد.
- (۳) در دومین سطح برخلاف اولین سطح، می‌توان با استفاده از کل نگری، ارتباط میان اجزای سامانه زیستی را بررسی نمود.
- (۴) در هشتمین سطح برعکس هفتمین سطح، امکان بررسی همزمان تعاملات عوامل زنده و غیرزنده با گیاهان برای افزایش محصول وجود دارد.

## زیربخش: فصل ۱-گفتار ۲-سطح سازمان یابی حیات

**دزد Box**

**سطح سازمان یابی حیات:**

- (۱) پایین‌ترین سطح سازمان یابی حیات: یاخته (همه جانداران از یاخته تشکیل شده‌اند؛ پس این سطح در همه جانداران وجود دارد).
  - (۲) سطحی از حیات که از تعامل چند یاخته با هم ایجاد می‌شود؟ بافت (جانداران پریاخته‌ای می‌توانند بافت داشته باشند، اما تک یاخته‌ای‌ها نه! در تک یاخته‌ای‌ها، از تعامل چند یاخته با هم امکان تشکیل جمعیت وجود دارد، اگر همه متعلق به یک گونه باشند).
  - (۳) بزرگ‌ترین سطح سازمان یابی حیات: زیستگره
  - (۴) اولین سطحی از حیات که از تعامل افراد با هم ایجاد می‌شود؟ جمعیت (بعد از جمعیت، در همه سطوح می‌توان تعامل افراد با هم را دید).
  - (۵) پایین‌ترین سطح از حیات که در آن تأثیرات عوامل زنده و غیرزنده محیط بر هم در نظر گرفته می‌شود؟ بومسازگان
  - (۶) اولین سطحی از حیات که می‌تواند از افراد غیر هم‌گونه ایجاد شود؟ اجتماع
  - (۷) سطحی که گستره حیات به آن ختم می‌شود؟ زیست‌بوم
  - (۸) هر سطحی از حیات که از تعامل جمعیت‌های گوناگون ساخته می‌شود؟ اجتماع، بومسازگان، زیست‌بوم و زیستگره.
- به عنوان مثال در اولین سطح حیات نیز می‌توان کل نگری را برای بررسی ارتباط میان اجزای سازنده یاخته استفاده نمود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

- گزینه (۱): در ششمین سطح، همه افراد، مربوط به یک جمعیت و لذا مربوط به یک گونه هستند، اما در هفتمین سطح (اجتماع)، جمعیت‌ها و بنابراین گونه‌های گوناگونی وجود دارند.
- گزینه (۲): دقیق کنید که در هشتمین سطح فقط یک اجتماع زیستی وجود دارد (نه اجتماعات)؛ اما در نهمین سطح، اجتماعات متعدد دیده می‌شود، لذا این گزینه مطلب صحیحی را بیان می‌کند.
- گزینه (۴): گیاهان مانند همه جانداران دیگر در محیط پیچیده، شامل عوامل غیرزنده مانند دما، رطوبت، نور و عوامل زنده شامل باکتری‌ها، قارچ‌ها، حشرات و مانند آن‌ها رشد می‌کنند و محصول می‌دهند؛ پس در سطح هفتم می‌توان فقط عوامل زنده و در سطح هشتم می‌توان عوامل زنده و غیرزنده مؤثر بر میزان محصولات گیاهان را بررسی نمود.

**پاسخ خیلی تشریحی ✓**

با توجه به اطلاعات کتاب درسی، در ارتباط با چهار گروه اصلی مولکول‌های سازنده یاخته، چند مورد درست است؟

**۲۳**

«هر نوع مولکول زیستی که ..... به طور حتم ..... ».  
 مولکول‌های زیستی (کربوهیدرات‌ها، لیپیدها، پروتئین‌ها و نوکلئیک اسیدها)

مولکول معروف به قند شیر، بیشتر است

ب) در قند و شکر وجود دارد - زیرا واحدهای متنوع تری از مالتوز دارد و هر زیر واحد آن، یک اتم کربن بیشتر از ریبوز دارد

ج) ذخیره گلوکز در کبد و ماهیچه انسان است - سه نوع عنصر مشترک با همه مولکول‌های زیستی، دارد

د) در سیب‌زمینی، از تعداد زیادی مونوساکارید ساخته شده است - در کاغذسازی، فاقد استفاده است

۲ (۴)

۴ (۳)

۱ (۲)

۳ (۱)

### زیرمبحث، فصل ا- گفتار ۲ - مولکول‌های زیستی

### پاسخ خیلی تشریحی ✓

موارد «الف»، «ب» و «ج» درست هستند.

منظور صورت سؤال، مولکول‌های زیستی (کربوهیدرات‌ها، لیپیدها، پروتئین‌ها و نوکلئیک اسیدها) است.

بررسی همه موارد:

الف) پروتئین‌ها در انتقال مواد در خون نقش دارند. طبق شکل ۷ کتاب درسی، زیرا واحدهای پروتئین‌ها بسیار متنوع‌اند، در حالی که مولکول معروف به قند شیر، لاکتوز (نوعی دی‌ساکارید و دارای دو مولکول مونوساکارید) است که حداکثر دو نوع زیر واحد می‌تواند داشته باشد.

ب) قند و شکر، همان ساکارز هستند. ساکارز از ترکیب گلوکز و فروکتوز ساخته شده است در حالی که مالتوز فقط از یک نوع مونوساکارید (گلوکز) تشکیل شده است. گلوکز و فروکتوز، هر دو ۶ کربنی‌اند، اما ریبوز مونوساکاریدی ۵ کربنی است.

ج) ذخیره گلوکز در کبد و ماهیچه انسان، گلیکوژن است. همه مولکول‌های زیستی سه عنصر کربن، هیدروژن و اکسیژن را دارا هستند.

### نکته

عناصر H, C و O در همه مولکول‌های زیستی وجود دارند. در کربوهیدرات‌ها و لیپیدها، تفاوت در نسبت این عناصر است، گرچه بعضی از لیپیدها مثل فسفولیپیدها، فیفات هم دارند. در پروتئین‌ها و نوکلئیک اسیدها عناصر دیگری هم یافت می‌شود؛ مثل N, P، S یا حتی (در برخی پروتئین‌ها).

د) سیب‌زمینی (نوعی گیاه) علاوه بر نشاسته، سلولز نیز وجود دارد. سلولز در کاغذسازی به کار می‌رود.

**۲۴**



کدام عبارت، صحیح است؟

۲۴

- (۱) هر مولکول زیستی که اتم نیتروژن دارد، کارهایی مانند انقباض ماهیچه و عملکرد آنزیمی دارد.
- (۲) هر مولکول زیستی که عنصر فسفر دارد، دارای دو اسید چرب است که خمیدگی‌هایی دارند.
- (۳) هر لیپیدی که در ساختار غشای جانوران دیده می‌شود، در ساختار برخی هورمون‌ها نیز وجود دارد.
- (۴) هر مولکول زیستی که چهار نوع عنصر دارد، در ذخیره اطلاعات و راثتی فاقد نقش است.

زیرمبتد: فصل ۱-گفتار ۲-مولکول‌های زیستی

## پاسخ خیلی شریحی ✓

فسفولیپیدها و پروتئین‌ها، چهار نوع عنصر دارند. مولکول ذخیره‌کننده اطلاعات و راثتی، دنا است که پنج نوع عنصر دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

- گزینه (۱): علاوه بر پروتئین‌ها، نوکلئیک اسیدها نیز نیتروژن دارند، اما مثلث انقباض ماهیچه، فقط برای پروتئین‌ها صادق است.
- گزینه (۲): علاوه بر فسفولیپیدها، نوکلئیک اسیدها نیز دارای فسفر هستند. در این میان، فقط فسفولیپید دارای دو اسید چرب است که طبق شکل کتاب درسی، خمیدگی‌هایی دارند.
- گزینه (۳): طبق متن کتاب درسی، فسفولیپیدها و کلسترول در ساختار غشای جانوران دیده می‌شوند. در این میان، فقط کلسترول در ساختار بعضی از هورمون‌ها نیز یافت می‌شوند.

نوکلئیک اسید	پروتئین	لیپید	کربوهیدرات	انواع مولکول‌های زیستی
P و C.H.O.N	N و C.H.O (عناصر دیگری مثل S و P هم می‌توانند داشته باشند.)	P و C.H.O (در گروهی از آن‌ها)	O و C.H	نوع عناصر
نوکلئوتید	آمینو اسید	مثل اسید چرب و گلیسرول <sup>۱</sup>	مونوساکارید	زیروحد سازنده
DNA ● RNA ●	متتنوع ترین گروه مولکول زیستی از نظر عملکرد	تری گلیسرید فسفولیپید کلسترول	مونوساکارید دیساکارید پلیساکارید	برخی از انواع آن
● ذخیره و انتقال اطلاعات و راثتی ● برخی رنها نقش آنزیمی دارند. (زیرست دوازدهم، فصل ۱)	● منبع تأمین کننده انرژی ● انتقال مواد در خون ● شرکت در ساختارهای پاخته‌ای مانند دیواره یاخته (مانند غشا) آنزیمی دارند.	● منبع تأمین کننده انرژی ● انتقال مواد در خون ● شرکت در ساختارهای یاخته (مانند غشا) ● کمک به عبور مواد از غشا ● تولید برخی هورمون‌ها و ...	● انقباض ماهیچه ● شرکت در ساختارهای پاخته‌ای مانند دیواره یاخته (مانند غشا) ● یاخته‌ای در گیاهان و ...	نقش

۱- کلسترول، گلیسرول و یا اسید چرب ندارد.

۲۵

۲۵

در ارتباط با خدمات زیست‌شناسی برای انسان، چند مورد نادرست است؟

- الف) به علت تأمین غذای انسان به طور مستقیم یا غیرمستقیم از گیاهان، افزایش شناخت گیاهان تنها راه برای تأمین غذای بیشتر است.
- ب) پایدار کردن بوم‌سازگان، تنها در شرایطی زندگی انسان را ارتقا می‌دهد که با تغییر اقلیم، تولید کنندگی آن کاملاً ثابت بماند.
- ج) گیاهان همانند اغلب جانداران دیگر، در محیطی پیچیده، رشد می‌کنند و محصول می‌دهند.
- د) با توجه به گرمایش و آلودگی زمین، بهبود سوخت‌های فسیلی از اهداف زیست‌شناسان است.

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۲

۴) ۱

## زیرمبتد، فصل ا- گفتار ا - زیست‌شناسی در فدمت انسان

پاسخ خیلی تشریحی ✓

همه موارد نادرست هستند.

بررسی همه موارد:

- الف) غذای انسان به طور مستقیم یا غیرمستقیم از گیاهان به دست می‌آید؛ پس شناخت بیشتر گیاهان یکی از راههای تأمین غذای بیشتر و با مواد مغذی بیشتر است.
- ب) پایدار کردن بوم‌سازگان به طوری که حتی در صورت تغییر اقلیم، تغییر چندانی در مقدار تولید کنندگی آن‌ها روی ندهد، موجب ارتقای کیفیت زندگی انسان می‌شود.
- ج) گیاهان مانند همه جانداران دیگر در محیطی پیچیده، شامل عوامل غیرزنده مانند دما، رطوبت، نور و عوامل زنده شامل باکتری‌ها، قارچ‌ها، حشرات و مانند آن‌ها رشد می‌کنند و محصول می‌دهند.
- د) سوخت‌های فسیلی موجب افزایش کربن دی‌اکسید جو، آلودگی هوا و در نهایت باعث گرمایش زمین می‌شوند. به همین دلیل، انسان باید در بی منابع پایدار، مؤثرتر و پاک‌تر انرژی برای کاهش واستگی به سوخت‌های فسیلی باشد. زیست‌شناسان می‌توانند به بهبود و افزایش تولید سوخت‌های ذیستی که از دانه‌های روغنی به دست می‌آید، کمک کنند.

۲۶



## فیزیکدهم

۲۶

در مدل سازی کدام یک از موارد زیر، می توانیم از اثر مقاومت هوا صرف نظر کنیم؟

الف) افتادن برگ درخت

ب) حرکت توپ بسکتبال به سمت حلقه

پ) هل دادن یک جسم نسبتاً بزرگ

ت) سقوط چتر بازی با چتر باز شده

(۱) «ب» و «پ»

(۲) «الف» و «پ»

(۳) «الف» و «ت»

(۴) «ب» و «ت»

**مشاوره** بیشتر تست های درس فیزیک در کنکور به صورت محاسباتی مطرح می شوند اما چنین تست هایی که جنبه مفهومی و غیر محاسباتی دارند نیز دیده می شوند.

## درین Box

مدل سازی در فیزیک، فرایندی است که طی آن یک پدیده فیزیکی، آن قدر ساده و آرمانی می شود تا امکان بررسی و تحلیل آن،

به راحتی فراهم شود. باید توجه داشت که فقط اثرهای جزئی را نادیده بگیریم؛ نه اثرهای مهم و تعیین کننده را.

## پاسخ خیلی تشریحی ✓

موارد «الف» تا «ت» را به ترتیب بررسی می کیم:

الف) نیروی مقاومت هوا در مقابل وزن برگ درخت، قابل ملاحظه است و باعث تغییر وضعیت برگ درخت می شود؛ بنابراین نمی توان از آن صرف نظر کرد. ✗

ب) در حرکت توپ بسکتبال به سمت حلقه، اثر مقاومت هوا، چندان تأثیرگذار نیست و قابل صرف نظر کردن است. ✓

پ) وقتی یک جسم بزرگ مانند یخچال را هُل می دهیم، تندی چندانی ندارد و اثر مقاومت هوا روی آن ناچیز است؛ پس می توان از آن صرف نظر کرد. ✓

ت) نیرویی که باعث می شود چتر باز به آرامی به زمین برسد، همین نیروی مقاومت هواست و نمی توان آن را نادیده گرفت. ✗

۲۷

**D** و **C**، **B**، **A** کمیت‌های فیزیکی هستند و رابطه  $A = BC + D$  بین آن‌ها برقرار است. اگر یکای کمیت **C** در SI ثانیه و کمیت

**۲۷**

سرعت باشد، **B** چه کمیتی است؟

۴) طول

۳) زمان

۲) شتاب

۱) سرعت


**درس Box**

هنگام جمع یا تفریق چند کمیت فیزیکی، باید آن کمیت‌ها، همنوع و دارای یکسان باشند. حاصل جمع یا تفریق آن‌ها هم از همان نوع کمیت و با همان یکا می‌باشد. اما هنگام ضرب و تقسیم کمیت‌های فیزیکی، این محدودیت وجود ندارد.

**پاسخ خیلی تشریحی ✓**

یکای  $BC$  باید با یکای  $D$  برابر باشد.

$$(B \text{ یکای } s^{\frac{C}{s}}) \times (C \text{ یکای } s^{\frac{m}{s}}) + (D \text{ یکای } s^{\frac{m}{s^2}}) \Rightarrow B \text{ یکای } s^{\frac{m}{s^2}}$$

بنابراین کمیت **B**، شتاب است.

**۲۸**



مقدار دو کمیت فیزیکی  $\frac{\text{mg}}{\text{m.s}^2}$  و  $\frac{\text{mN}}{2 \times 10^{-3}}$  است. مقدار این دو کمیت بر حسب یکاهای SI به ترتیب از راست

۲۸

به چه کدام است؟

(۱)  $1/7 \times 10^3 \text{ N} / 2 \times 10^5 \text{ s}^2$

(۲)  $1/7 \times 10^3 \text{ N} / 2 \times 10^5 \text{ s}^2$

(۳)  $1/7 \times 10^3 \text{ N} / 2 \times 10^5 \text{ s}^2$

(۴)  $1/7 \times 10^3 \text{ N} / 2 \times 10^5 \text{ s}^2$

**مشاوره** تبدیل یکای کمیت‌های فیزیکی، از مباحث پُرکاربردی است که در تمام فصل‌ها و تمام پایه‌های دبیرستان، با آن سروکار داریم پس خوب یاد بگیرید.

۱) پیشوند یکاهای جدول زیر، پیشوندهای یکاهای به همراه ضرب و نماد آن‌ها را نشان می‌دهد.

درس Box

پیشوندهای یکاهای					
نماد	پیشوند	ضریب	نماد	پیشوند	ضریب
y	یوکتو	$10^{-24}$	Y	یوتا	$10^{-24}$
z	زیتو	$10^{-21}$	Z	زتا	$10^{-21}$
a	آتو	$10^{-18}$	E	ایگزا	$10^{-18}$
f	فیتو	$10^{-15}$	P	پتا	$10^{-15}$
p	پیکو	$10^{-12}$	T	ترَا	$10^{-12}$
n	نانو	$10^{-9}$	G	گیگا (جیگا)	$10^9$
$\mu$	میکرو	$10^{-6}$	M	مِگا	$10^6$
m	میلی	$10^{-3}$	k	کیلو	$10^3$
c	سانتی	$10^{-2}$	h	هکتو	$10^2$
d	دیسی	$10^{-1}$	da	دِکا	$10^1$

۲) روش تبدیل زنجیره‌ای: در این روش، اندازه کمیت را در یک یا چند ضرب و نماد می‌کنیم، هر ضرب تبدیل به صورت یک کسر است که برابر عدد یک است. (می‌دانیم ضرب کردن هر کمیت در عدد یک، اندازه آن کمیت را تغییر نمی‌دهد.) ذکر یکاهای در صورت و مخرج ضرب و نماد می‌کنیم.

پاسخ خیلی شریحی ✓

با استفاده از روش تبدیل زنجیره‌ای، مقدار هر یک از دو کمیت فیزیکی داده شده را بر حسب یکاهای SI می‌نویسیم.

$$\frac{\text{mN}}{2 \times 10^8} = \frac{\text{mg}}{2 \times 10^8} \times \frac{10^{-3} \text{ g}}{1 \text{ mg}} \times \frac{1 \text{ kg}}{10^3 \text{ g}} = \frac{5/2 \times 10^8 \times 10^{-3}}{10^3} \frac{\text{kg}}{\text{m.s}^2} = \frac{5/2 \times 10^5}{10^3} \frac{\text{kg}}{\text{m.s}^2}$$

$$\frac{1/7 \times 10^{-3} \text{ mN}}{\text{ng}} = \frac{1/7 \times 10^{-3} \text{ N}}{\text{ng}} \times \frac{10^{-3} \text{ N}}{1 \text{ mN}} \times \frac{1 \text{ ng}}{10^{-9} \text{ g}} \times \frac{10^3 \text{ g}}{1 \text{ kg}} = \frac{1/7 \times 10^{-3} \times 10^{-3} \times 10^3}{10^{-9}} \frac{\text{N}}{\text{kg}} = \frac{1/7 \times 10^{-3} \times 10^{-3} \times 10^3}{10^{-9}} \frac{\text{N}}{\text{kg}}$$

۲۹



کامیونی حامل ۲ خروار هندوانه و ۲۵۰ من تبریز طالبی است. جرم کل بار این کامیون چند مثقال است؟

$$1 \text{ خروار} = 100 \text{ من تبریز} \quad 1 \text{ من تبریز} = 40 \text{ سیر} \quad 1 \text{ سیر} = 16 \text{ مثقال}$$

$$160000 \quad (2)$$

$$144000 \quad (1)$$

$$288000 \quad (4)$$

$$128000 \quad (3)$$

۲۹



با استفاده از روش تبدیل زنجیره‌ای، جرم هندوانه‌ها و طالبی‌ها را جداگانه بر حسب مثقال به دست آورید و آن‌ها را با هم جمع کنید.

گام اول: با استفاده از روش تبدیل زنجیره‌ای، جرم هندوانه‌ها را بر حسب مثقال به دست می‌آوریم.

$$\text{مثقال} = \frac{\text{من تبریز}}{1 \text{ خروار}} \times \frac{40 \text{ سیر}}{1 \text{ من تبریز}} \times \frac{16 \text{ مثقال}}{1 \text{ سیر}} = 2 \times 100 \times 40 \times 16 \text{ مثقال} = 2 \times 100 \times 40 \times 16 \text{ هندوانه}$$

$$\Rightarrow \text{مثقال} = 128000 \text{ هندوانه}$$

گام دوم: جرم طالبی‌ها را نیز با کمک روش تبدیل زنجیره‌ای، بر حسب مثقال حساب می‌کنیم.

$$\text{مثقال} = \frac{40 \text{ سیر}}{1 \text{ من تبریز}} \times \frac{250 \text{ مثقال}}{1 \text{ سیر}} = 250 \times 40 \times 16 \text{ مثقال} = 250 \times 40 \times 16 \text{ طالبی}$$

$$\Rightarrow \text{مثقال} = 160000 \text{ طالبی}$$

گام سوم: مجموع جرم‌های طالبی  $m_{\text{طالبی}}$  و هندوانه  $m_{\text{هندوانه}}$  را به دست می‌آوریم:

$$\text{مثقال} = 128000 + 160000 = 288000 \text{ هندوانه}$$

Hint

پاسخ خیلی تشریحی ✓



سریع ترین رشد گیاه متعلق به گیاهی موسوم به هسپروپوکا است که در مدت ۱۴ روز،  $\frac{3}{7} \text{ m}$  رشد می‌کند. آهنگ رشد این گیاه

۳۰

بر حسب میکرون بر ثانیه تقریباً چقدر است؟

میکرون یعنی میکرومتر

$\frac{73}{4}(2)$

(۱)  $183$

(۲)  $3/06(4)$

(۳)  $6/12(3)$

**مشاوره** این تست یکی از پرسش‌های کتاب درسی است. تمرین‌ها و پرسش‌های کتاب درسی راجدی بگیرید.

درست Box

۱) هر میکرون یا میکرومتر، معادل  $10^{-6} \text{ m}$  است.

۲) در فیزیک، تغییر هر کمیت را نسبت به زمان، معمولاً آهنگ آن کمیت می‌نامیم.

با استفاده از روش تبدیل زنجیره‌ای یکاها، آهنگ رشد این گیاه را حساب می‌کنیم.

$$\frac{\frac{3}{7} \text{ m}}{14 \text{ day}} = \frac{\frac{3}{7} \text{ m}}{14 \text{ day}} \times \frac{1 \text{ day}}{24 \text{ h}} \times \frac{1 \text{ h}}{60 \text{ min}} \times \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} \times \frac{1 \mu\text{m}}{10^{-6} \text{ m}} = \frac{\frac{3}{7}}{14 \times 24 \times 60 \times 60 \times 10^{-6}} \frac{\mu\text{m}}{\text{s}} = \frac{\frac{3}{7}}{1/2096} \frac{\mu\text{m}}{\text{s}} = 3/06 \frac{\mu\text{m}}{\text{s}}$$

۳۱



وقتی می‌گویند کمیتی مانند A چند درصد تغییر کرده است، یعنی:

$$\frac{\Delta A}{A_1} \times 100 = \frac{A_2 - A_1}{A_1} \times 100$$

گام اول: مدت زمان سخنرانی را با  $\Delta t_1$  و یک میکروقرن را با  $\Delta t_2$  نشان می‌دهیم.

$$\Delta t_1 = ۵۰ \text{ min}$$

$$\Delta t_2 = ۱۰^{-۶} \times ۱۰۰ \times ۳۶۵ \times ۲۴ \times ۶۰ \text{ min} = ۵۲ / ۵۶ \text{ min}$$

گام دوم: درصد اختلاف یک میکروقرن با  $۵۰ \text{ min}$  را حساب می‌کنیم.

$$\frac{\Delta t_2 - \Delta t_1}{\Delta t_1} \times 100 = \frac{۵۲ / ۵۶ - ۵۰}{۵۰} \times 100 \approx ۵\%$$



۳۲

طول کل خطوط انتقال نفت خام، گاز و سایر فراورده‌های سوختی در ایران  $389 \times 10^5$  m و زمان تقریبی بین دو ضربان عادی قلب ۰/۸۵ است. طول کل خطوط انتقال بر حسب کیلومتر و زمان تقریبی بین دو ضربان عادی قلب بر حسب میلی ثانیه و به صورت نمادگذاری علمی به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

$$8 \times 10^{-1} \text{ و } 3 / 89 \times 10^4 \quad (2)$$

$$8 \times 10^{-1} \text{ و } 3 / 89 \times 10^7 \quad (1)$$

$$8 \times 10^2 \text{ و } 3 / 89 \times 10^7 \quad (4)$$

$$8 \times 10^2 \text{ و } 3 / 89 \times 10^4 \quad (3)$$

دریس Box

**نمادگذاری علمی:** برای آن که نوشتن و محاسبه مقادرهای خیلی بزرگ یا خیلی کوچک ساده شود، از روشی به نام نمادگذاری علمی استفاده می‌کنیم. در این روش، اندازه هر کمیت فیزیکی به صورت کلی  $X \times 10^n$  نوشته می‌شود که در آن  $1 \leq X < 10$  و  $n$  عددی صحیح است و جلوی آن، یکای آن کمیت نوشته می‌شود.

گام اول: طول کل خطوط انتقال ( $L$ ) را بر حسب کیلومتر به دست آورده و آن را به صورت نمادگذاری علمی می‌نویسیم.

$$L = 389 \times 10^5 \text{ m} \times \frac{1 \text{ km}}{10^3 \text{ m}} = 389 \times 10^2 \text{ km} = 3 / 89 \times 10^4 \text{ km}$$

گام دوم: زمان تقریبی بین دو ضربان عادی قلب ( $T$ ) را بر حسب میلی ثانیه به دست آورده و آن را به صورت نمادگذاری علمی می‌نویسیم.

$$T = 0.8 \text{ s} \times \frac{1 \text{ ms}}{10^{-3} \text{ s}} = 0.8 \times 10^3 \text{ ms} = 8 \times 10^2 \text{ s}$$

۳۳

آزمایشگری در حال اندازه‌گیری طول یک جسم است. کدام موارد از عبارت‌های زیر، خطای اندازه‌گیری را کاهش می‌دهد؟

۳۳

(الف) استفاده از ابزار رقمی (دیجیتال)

(ب) استفاده از ابزار دقیق

(پ) استفاده از ابزار مدرج (درجه‌بندی شده)

(ت) روش صحیح اندازه‌گیری

(۲) «ب» و «ت»

(۱) «ب» و «پ»

(۴) «الف» و «ب»

(۳) «الف» و «ت»

### پاسخ خیلی تشریحی ✓


در اندازه‌گیری کمیت‌های فیزیکی مثل طول، جرم، زمان و ... قطعیت وجود ندارد و همواره مقداری خطأ وجود دارد. هیچ وقت نمی‌توانیم خطای اندازه‌گیری را به صفر برسانیم ولی می‌توانیم با انتخاب وسیله‌های دقیق و روش صحیح اندازه‌گیری آن را کاهش بدھیم.

۳۴

کدام یک از ابزارهای اندازه‌گیری زیر، ریزسنج نام دارد و دقت اندازه‌گیری کولیس چند سانتی‌متر است؟



(الف)



(ب)

۳۴

**مشاوره** برخی مطالب درسی و آموزشی در قالب مثال‌ها و پرسش‌ها در کتاب درسی مطرح می‌شوند. مثلاً کولیس و ریزسنج در یکی از تمرین‌های کتاب درسی معرفی شده‌اند.

۱) ب - ۰/۰۱

۲) الف - ۰/۰۱

۳) ب - ۰/۰۱

۴) الف - ۰/۰۱

### Box

#### پاسخ خیلی تشریحی ✓

دقت اندازه‌گیری یک ابزار رقی (دیجیتال)، برابر یک واحد از آخرین رقمی است که آن ابزار می‌خواند.

شکل (الف) یک ریزسنج و شکل (ب) یک کولیس را نشان می‌دهد. دقت اندازه‌گیری کولیس (شکل ب)،  $0.01 \text{ mm}$  است و سوال

از ما این مقدار را بر حسب  $\text{cm}$  می‌خواهد؛ بنابراین با استفاده از تبدیل زنجیره‌ای می‌توانیم بنویسیم:

$$0.01 \text{ mm} \times \frac{10^{-3} \text{ m}}{1 \text{ mm}} \times \frac{1 \text{ cm}}{10^{-2} \text{ m}} = 0.001 \text{ cm}$$

۳۵

دو کره توپر A و B از یک سنگ همگن بریده شده‌اند. شعاع کره A  $4/5\text{ cm}$  و جرم کره B برابر جرم کره A است. شعاع کره B چگالی دو کره A و B یکسان است.

۳۶ (۴)

۹ (۳)

۱۸ (۲)

۲/۲۵ (۱)

چند سانتی‌متر است؟

**۳۵**

**درس Box**

حجم کره‌ای با شعاع R از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

**پاسخ خیلی تشریحی ✓** هر دو کره از یک سنگ همگن بریده شده‌اند؛ پس چگالی یکسانی دارند و می‌توان نوشت:

$$\begin{aligned} \rho_A = \rho_B &\Rightarrow \frac{m_A}{V_A} = \frac{m_B}{V_B} \quad \xrightarrow[V=\frac{4}{3}\pi R^3]{m_B=\lambda m_A} \frac{m_A}{\frac{4}{3}\pi R_A^3} = \frac{\lambda m_A}{\frac{4}{3}\pi R_B^3} \\ &\Rightarrow \frac{1}{R_A^3} = \frac{\lambda}{R_B^3} \quad \xrightarrow{\sqrt[3]{\quad}} \quad \frac{1}{R_A} = \frac{2}{R_B} \quad \xrightarrow[R_A=4/5\text{ cm}]{\quad} R_B = 2 \times 4/5 = 9\text{ cm} \end{aligned}$$



۳۶

چگالی جسم A نصف چگالی جسم B و حجم g  $16\text{ cm}^3$  از جسم B برابر با  $15\text{ cm}^3$  از جسم A، چند گرم است؟

۶۰ (۲)

۲۴۰ (۱)

۱۲۰ (۴)

 $\frac{15}{16}$  (۳)

**مشاوره** برای آن که مقادیر  
کمیت‌های فیزیکی (مثلًاً در اینجا  
جرم و حجم) را با هم اشتباہ نگیرید،  
به یکای آن‌ها دقت کنید.

پاسخ خیلی تشریحی ✓

رابطه چگالی را برای هر دو جسم A و B در نظر می‌گیریم و چگالی جسم A را نصف چگالی جسم B قرار می‌دهیم.

$$\rho_A = \frac{1}{2} \rho_B \Rightarrow \frac{m_A}{V_A} = \frac{1}{2} \times \frac{m_B}{V_B}$$

$$\frac{m_B = 16\text{ g}, V_B = 20\text{ cm}^3}{m_A = ?, V_A = 15\text{ cm}^3} \rightarrow \frac{m_A}{15} = \frac{1}{2} \times \frac{16}{20} \Rightarrow \frac{m_A}{15} = 4 \Rightarrow m_A = 4 \times 15 = 60\text{ g}$$


۳۷



۱) مطابق شکل زیر، دو مایع مخلوط نشدنی با چگالی‌های  $\rho_1 = 1\text{ g/cm}^3$  و  $\rho_2 = 1/2\text{ g/cm}^3$  در یک استوانه با شعاع مقطع ۱m

۳۷

ریخته شده است. جرم کل مایع‌های درون استوانه چند کیلوگرم است؟



۴۰۰ (۴)

۳۷۰ (۳)

۱۲۵۶ (۲)

۱۱۶۱ (۱)

۳۸

درین Box


(۱) حجم استوانه از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\begin{array}{c} \text{شعاع مقطع (m)} \\ V = \pi R^2 h \rightarrow (\text{حجم}) (\text{m}^3) \\ \text{ارتفاع (m)} \\ \downarrow \quad \uparrow \\ \text{حجم (m}^3\text{)} \end{array}$$

(۲) یکی از یکاهای متداول چگالی، یکای  $\text{kg/m}^3$  است. برای تبدیل یکای  $\text{g/cm}^3$  به یکای  $\text{kg/m}^3$  (و برعکس!) به صورت زیر عمل می‌کنیم:

$$\text{g/cm}^3 \xleftarrow[\div 1000]{\times 1000} \text{kg/m}^3$$

(۳) دو مایع مخلوط نشدنی با چگالی‌های متفاوت را در نظر بگیرید. اگر این دو مایع را درون ظرفی بروزیم، مایعی که چگالی آن بیشتر است، در کف ظرف قرار می‌گیرد؛ مثلاً در شکل رو به رو، چگالی مایع B از چگالی مایع A بیشتر است.



مایع (۱) که چگالی کمتری دارد، روی مایع (۲) که چگالی بیشتری دارد قرار می‌گیرد. بر این اساس، جرم هر یک از دو مایع را به دست آورده و با هم جمع می‌کنیم.

$$m_1 = \rho_1 V_1 = \rho_1 \pi R^2 h_1$$

$$\frac{\rho_1 = 1\text{ g/cm}^3 = 1\text{ kg/m}^3, \pi = 3.14}{R_1 = 1\text{ m}, h_1 = 25 - 25 = 0\text{ cm} = 0\text{ m}} \rightarrow m_1 = 10^3 \times 3 / 14 \times 1^2 \times 10^{-1} = 314\text{ kg}$$

$$m_2 = \rho_2 V_2 = \rho_2 \pi R^2 h_2$$

$$\frac{\rho_2 = 1/2\text{ g/cm}^3 = 1/2\text{ kg/m}^3, \pi = 3.14}{R_2 = 1\text{ m}, h_2 = 25 - 0 = 25\text{ cm} = 0.25\text{ m}} \rightarrow m_2 = 1200 \times 3 / 14 \times 1^2 \times 0.25 = 942\text{ kg}$$

حالا جرم کل دو مایع درون استوانه را حساب می‌کنیم.

$$m_{\text{کل}} = m_1 + m_2 = 314 + 942 = 1256\text{ kg}$$

پاسخ خیلی تشریحی ✓



۳۸

یک ظرف استوانه‌ای شکل با مساحت مقطع  $5\text{ cm}^2$  حاوی  $1/5\text{ L}$  آب است. درون این ظرف، یک قطعه فلزی با جرم  $0.3\text{ kg}$  و چگالی  $5\text{ g/cm}^3$  و یک قطعه فلزی دیگر با جرم  $54\text{ g}$  و چگالی  $6000\text{ kg/m}^3$  را می‌اندازیم. در این حالت، ارتفاع آب نسبت به قبل از انداختن قطعه‌ها چند سانتی‌متر تغییر کرده است؟ (هر دو قطعه درون آب فرو می‌روند و  $\rho_{\text{آب}} = 1\text{ g/cm}^3$  است.)

۳ (۴)

۱۶ / ۸ (۳)

۷ / ۸ (۲)

۱۲ (۱)



پاسخ خوبی تشریحی ✓

گام اول: حجم هر یک از دو قطعه فلزی را با استفاده از رابطه چگالی به دست می‌آوریم.

$$V_A = \frac{m_A}{\rho_A} \xrightarrow{\rho_A = 5\text{ g/cm}^3} V_A = \frac{3}{5} = 0.6\text{ cm}^3$$

$$V_B = \frac{m_B}{\rho_B} \xrightarrow{\rho_B = 6000\text{ kg/m}^3 = 6\text{ g/cm}^3} V_B = \frac{54}{6} = 9\text{ cm}^3$$

گام دوم: حجم آبی که درون ظرف بالا می‌آید، برابر است با مجموع حجم‌های A و B.

$$\Delta V = V_A + V_B = 0.6 + 9 = 9.6\text{ cm}^3$$


گام سوم: حالا با معلوم بودن مساحت مقطع ظرف، تغییر ارتفاع آب نسبت به قبل را حساب می‌کنیم.

$$\Delta V = A \Delta h \xrightarrow{A = 5\text{ cm}^2} 9.6 = 5 \Delta h \Rightarrow \Delta h = 1.92\text{ cm}$$

۳۹

نمودار حجم بر حسب جرم دو جسم A و B مطابق شکل زیر است.  $m_B$  چند گرم است؟

۳۹



۸۱ (۴)

۴۸ (۳)

۱۴۴ (۲)

۱۶ (۱)

پاسخ خیلی تشریحی ✓

نسبت چگالی جسم A به جسم B را می‌نویسیم:

$$\frac{\rho_A}{\rho_B} = \frac{\frac{m_A}{V_A}}{\frac{m_B}{V_B}} = \frac{m_A}{m_B} \times \frac{V_B}{V_A} \quad \text{با } \rho_A = ۲۷۰۰ \text{ kg/m}^3, m_A = ۱۲ \text{ g}, \rho_B = ۳۶۰۰ \text{ kg/m}^3, V_A = V_B = V \Rightarrow \frac{۲۷۰۰}{۳۶۰۰} = \frac{۱۲}{m_B} \times \frac{V}{V} \Rightarrow \frac{۳}{۴} = \frac{۱۲}{m_B} \Rightarrow m_B = ۱۶ \text{ g}$$

توجه شود که وقتی روابط فیزیکی به صورت نسبتی نوشته می‌شوند، همین که یکای صورت و مخرج هر قسمت یکسان باشد، کافی است و ضروری نیست که حتماً یکاهای SI باشند.

۴۰



دو مایع A و B و هر یک با جرم m را داخل ظرفی می‌ریزیم و بایکدیگر مخلوط می‌کنیم، سپس مایع A با جرم m با مایع B مخلوط شده در ظرف دیگری می‌ریزیم و با هم مخلوط می‌کنیم. چگالی مخلوط نهایی چند گرم بر لیتر است؟ ( $\rho_B = 2 \text{ g/cm}^3, \rho_A = 1 \text{ g/cm}^3$ ) و از تغییر حجم در اثر مخلوط صرف نظر شود.

۴۰

۱/۲ (۲)

۱۲۰۰ (۴)

۱۵۰۰ (۱)

۱/۵ (۳)



درس Box

اگر دو یا چند ماده با جرم‌های  $m_1, m_2, \dots$  و حجم‌های  $V_1, V_2, \dots$  و چگالی‌های  $\rho_1, \rho_2, \dots$  با یکدیگر مخلوط شوند (به شرطی که تغییر حجم رخ ندهد)، چگالی ماده حاصل، از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$\rho = \frac{m_1 + m_2 + \dots}{V_1 + V_2 + \dots} = \frac{m_1 + m_2 + \dots}{\frac{m_1}{\rho_1} + \frac{m_2}{\rho_2} + \dots}$$

گام اول: ابتدا چگالی حاصل از مخلوط دو مایع A و B را حساب می‌کنیم.

$$\rho_{A \text{ و } B \text{ مخلوط}} = \frac{m_A + m_B}{\frac{m_A}{\rho_A} + \frac{m_B}{\rho_B}} \xrightarrow[m_A = m_B = m, \rho_A = \frac{g}{cm^3}, \rho_B = 2 \frac{g}{cm^3}]{} - \rho_{A \text{ و } B \text{ مخلوط}} = \frac{2m}{\frac{m}{1} + \frac{m}{2}} = \frac{2 \cancel{m}}{\frac{3}{2} \cancel{m}} = \frac{4}{3} \frac{g}{cm^3}$$


گام دوم: در ادامه، مایع حاصل از مخلوط دو مایع A و B و مایع A با جرم m با یکدیگر مخلوط شده است. چگالی مخلوط

نهایی را مشابه گام اول به دست می‌آوریم.

$$\rho_{\text{مخلوط نهایی}} = \frac{\frac{m_{A \text{ و } B \text{ مخلوط}} + m'_A}{\frac{m_{A \text{ و } B \text{ مخلوط}}}{\rho_{A \text{ و } B \text{ مخلوط}}} + \frac{m'_A}{\rho_A}}{\frac{m_{A \text{ و } B \text{ مخلوط}}}{\rho_{A \text{ و } B \text{ مخلوط}}} + \frac{m'_A}{\rho_A}} \xrightarrow[m_{A \text{ و } B \text{ مخلوط}} = 2m, m'_A = m, \rho_{A \text{ و } B \text{ مخلوط}} = \frac{4}{3} \frac{g}{cm^3}, \rho_A = 1 \frac{g}{cm^3}]{} \rho_{\text{مخلوط نهایی}} = \frac{2m + m}{\frac{4}{3}m + m} = \frac{10}{7} \frac{g}{cm^3}$$

۴۱

نمودار زیر مربوط به درصد فراوانی سه عنصر فراوان‌تر یکی از سیاره‌های زمین یا مشتری است. با توجه به آن، کدام مطلب درست است؟



۱) نمودار داده شده، مربوط به مشتری است و A همان هیدروژن است.

۲) نمودار داده شده مربوط به زمین است و D همان کربن است.

۳) عنصر X، جزء عنصرهای مشترک در بین ۸ عنصر فراوان‌تر دو سیاره زمین و مشتری است.

۴) عنصر A، نخستین عنصری است که پس از مهبانگ، پا به عرصه جهان گذاشته است.


**دریس Box**

مقایسه برخی از ویژگی‌های مهم در سیاره زمین و مشتری:

مشتری	زمین	نام سیاره	ویژگی
هیدروژن (H)	آهن (Fe)	فراوان‌ترین عنصر	
بیشتر از ۵۰ درصد (حدود ۹۰٪)	کمتر از ۵۰ درصد (حدود ۴۰٪)	درصد فراوانی فراوان‌ترین عنصر	
نئون (Ne)	آلومینیم (Al)	عنصری با کمترین فراوانی در بین ۸ عنصر فراوان	
گاز	ستگ	بیشتر از چه جنسی است؟	
زمین > مشتری		اندازه (شعاع)	
زمین > مشتری		فاصله از خورشید	
اکسیژن (O) و گوگرد (S)		عنصرهای مشترک در بین ۸ عنصر فراوان	
مشتری > زمین		درصد فراوانی عنصرهای مشترک در بین ۸ عنصر فراوان	

با توجه به این که درصد فراوانی فراوان‌ترین عنصر (A)، کمتر از ۵۰٪ است، نمودار، سه عنصر فراوان‌تر زمین را نمایش می‌دهد.

عنصر X، همان اکسیژن بوده که جزء عناصر مشترک زمین و مشتری است.

۳ عنصر فراوان‌تر زمین : Fe > O > Si

۳ عنصر فراوان‌تر مشتری : H > He > C

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه (۱): نمودار داده شده مربوط به سه عنصر فراوان‌تر زمین است.

فراؤان‌ترین عنصر مشتری، هیدروژن بوده و درصد فراوانی آن حدود ۹۰٪ است، در حالی که فراوان‌ترین عنصر سازنده زمین، آهن بوده و درصد فراوانی آن کمتر از ۵۰٪ است.

**نکته**

گزینه (۲): سومین عنصر سازنده فراوان زمین، سیلیسیم (Si) است، نه کربن.

گزینه (۴): عنصر A، همان آهن است و جزء عناصر سنگین دسته‌بندی می‌شود؛ پس از مهبانگ، ابتدا عناصر سبک‌تر مانند H و He تولید شدند.



کدام مطلب نادرست است؟

۴۲

۱) شمار عناصر طبیعی در جدول تناوبی، به تقریب  $\frac{3}{5}$  برابر شمار عناصر ساختگی در آن است.۲) خواص شیمیایی عنصری با عدد اتمی ۹، شبیه به خواص شیمیایی  $X_{17}$  است.۳) در اتم  $E_Z^A$ ، اگر مقدار  $A - Z$  برابر تعداد پروتون‌ها باشد، شمار هر یک از ذره‌های زیراتمی در اتم  $E$  برابر است.

۴) تعداد نوترون‌ها در پایدارترین ایزوتوپ طبیعی لیتیم، برابر با تعداد ایزوتوپ‌های طبیعی هیدروژن است.

**نکته**

۹۲ عنصر موجود در طبیعت (به تقریب ۷۸٪)  
 ۱۱۸ عنصر  
 شناخته شده ۲۶ عنصر ساختگی (به تقریب ۲۲٪) در طبیعت وجود ندارند و در واکنشگاه هسته‌ای، توسط انسان ساخته شده‌اند.

لیتیم دارای دو ایزوتوپ طبیعی با نامدهای  $Li_3^7$  و  $Li_4^7$  بوده و فراوانی  $Li_7^7$  در طبیعت بیشتر است. در هر اتم از  $Li_7^7$  نوترون وجود دارد. می‌دانیم که هیدروژن نیز، دارای ۴ ایزوتوپ ساختگی و ۳ ایزوتوپ طبیعی است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه (۱): در جدول تناوبی، ۱۱۸ عنصر وجود دارد که ۹۲ عنصر آن، طبیعی و ۲۶ عنصر آن، ساختگی است؛ بنابراین نسبت خواسته شده برابر است با:

$$\frac{92}{26} \approx \frac{3}{5}$$

گزینه (۲): عناصری با اعداد اتمی ۹ و ۱۷ در گروه ۱۷ جدول تناوبی جای دارند.  
 عناصری که در یک گروه از جدول تناوبی جای دارند، خواص شیمیایی مشابهی دارند.

گزینه (۳):  $A$  و  $Z$  به ترتیب نشان‌دهنده عدد جرمی و عدد اتمی هستند و دارای:

$$\begin{cases} A = n + p \\ Z = p \end{cases}$$

با در نظر گرفتن فرض سؤال می‌توان نوشت:

$$A - Z = p \Rightarrow \underbrace{n}_{A} + \underbrace{p}_{Z} - p = p \Rightarrow n = p$$

بنابراین در اتم خنثی  $E$ ، شمار کل ذرات زیراتمی با هم برابر است.

در یک اتم خنثی، تعداد الکترون‌ها (ذرات باردار منفی) با تعداد پروتون‌ها (ذرات باردار مثبت) برابر است.

شمار الکترون‌های  $A^{84}$ ،  $8$  برابر شمار نوترون‌های کدام گونه است؟

**۴۳**

$$_{25}^{55}M^{2+} (2)$$

$$_{53}^{127}D^- (4)$$

$$_{25}^{36}X (1)$$

$$_{50}^{120}Z (3)$$

**مشاوره** یکی از مباحث پرتکرار و مورد علاقه طراحان کنکور سراسری، مسائل شمارش تعداد ذره‌های زیراتمی است.

**پاسخ خیلی تشریحی ✓** اتم  $A$ ، یک اتم خنثی بوده و در آن تعداد پروتون‌ها با الکترون‌ها برابر است. چون عدد اتمی  $A$ ، برابر  $36$  است، پس در هر اتم از  $A$ ،  $36$  پروتون و  $36$  الکترون وجود دارد.

در اتم  $_{Z}^A E$  یا کاتیون‌ها ( $_{Z}^A E^{m+}$ ) و آنیون‌ها ( $_{Z}^A E^{m-}$ )، شمار نوترون‌ها به مقدار بار الکتریکی وابسته نیست و از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\begin{array}{l} n = A - Z \\ \downarrow \\ \text{نوترون} \end{array}$$

**نکته**

شمار نوترون‌ها در هر گونه را به دست می‌آوریم:

$$_{25}^{36}X \Rightarrow n = 36 - 25 = 11$$

$$_{25}^{55}M^{2+} \Rightarrow n = 55 - 25 = 30$$


$$_{50}^{120}Z \Rightarrow n = 120 - 50 = 70$$

$$_{53}^{127}D^- \Rightarrow n = 127 - 53 = 74$$

نسبت شمار الکترون‌ها در  $A^{84}$ ،  $8$  برابر شمار نوترون‌ها در  $_{25}^{36}X$  است. محاسبات انجام‌شده به صورت زیر است:

$$\frac{36}{45} = 0.8$$

در شکل زیر، ایزوتوپ‌های طبیعی هیدروژن و منیزیم بر حسب افزایش پایداری آن‌ها مرتب شده‌اند. بر این اساس، کدام موارد از مطالب زیر درست است؟ (۱) نماد نوترون و  $p$ ، نماد پروتون است.



۴۴

الف) از میان ایزوتوپ‌های داده شده، فقط در دو مورد،  $n \leq p$  است.

ب) شمار نوترون‌ها در اتم  $G$  برابر مجموع شمار نوترون‌ها در دو اتم  $B$  و  $C$  است.

پ) شمار الکترون‌ها در  $F^{2+}$  با شمار الکترون‌ها در  $D^{2+}$  برابر است.

ت) ایزوتوپ  $D$  نسبت به سایر ایزوتوپ‌های منیزیم در طبیعت، فراوانی کمتر و عدد جرمی بزرگ‌تری دارد.

(۱) الف - ت      (۲) الف - پ

(۳) ب - ت


(۳) ب - پ

۴۵

ایزوتوپ‌های طبیعی چند عنصر زیر را به خاطر بسپارید.

**نکته**

ترتیب پایداری و فراوانی در طبیعت	ایزوتوپ‌ها	عنصر
$^{24}_{12}\text{Mg} > ^{26}_{12}\text{Mg} > ^{28}_{12}\text{Mg}$	$^{24}_{12}\text{Mg}, ^{25}_{12}\text{Mg}, ^{26}_{12}\text{Mg}$	(Mg) منیزیم
$^1\text{H} > ^2\text{H} > ^3\text{H}$	$^1\text{H}, ^2\text{H}, ^3\text{H}$	(H) هیدروژن
$^7\text{Li} > ^6\text{Li}$	$^6\text{Li}, ^7\text{Li}$	(Li) لیتیم

**پاسخ خیلی تشریحی** ✓ طبق نکته ذکر شده می‌توان نوشت:


بر این اساس، عبارت‌های «ب» و «پ» درست‌اند.

بررسی عبارت‌ها:

الف) از بین ایزوتوپ‌های داده شده در سه مورد،  $n \leq p$  است:

$$^1\text{H} \Rightarrow \begin{cases} p = 1 \\ n = 0 \end{cases} \Rightarrow n < p \quad | \quad ^1\text{H} \Rightarrow \begin{cases} p = 1 \\ n = 1 \end{cases} \Rightarrow n = p \quad | \quad ^{24}_{12}\text{Mg} \Rightarrow \begin{cases} p = 12 \\ n = 12 \end{cases} \Rightarrow n = p$$

(ب)

$$\begin{cases} G \Rightarrow ^{24}_{12}\text{Mg} \Rightarrow n = 12 \\ B \Rightarrow ^1\text{H} \Rightarrow n = 1 \Rightarrow n = 3 \\ C \Rightarrow ^2\text{H} \Rightarrow n = 2 \end{cases} \Rightarrow \text{مجموع} = 3 = \frac{12}{4} = 3 \Rightarrow \text{نسبت خواسته شده}$$

پ) F و D به ترتیب معادل با  $Mg^{2+}$  و  $Mg^{2+}$  هستند و در هر دو یون  $F^{2+}$  و  $D^{2+}$  الکترون وجود دارد.

ت) در صد فراوانی ایزوتوپ  $Mg^{2+}$  در طبیعت کمتر از سایر ایزوتوپ‌های منیزیم است، ولی عدد جرمی آن کمتر از  $Mg^{2+}$  است.

۴۵



۴۵

برای یون  $\text{Y}^{4+}$ ، رابطه  $A = 2/5Z + 2$  برقرار است. اگر یون  $\text{Y}^{4+}$  دزه زیراتمی باشد، نسبت شمار الکترون‌ها به نوترون‌ها در یون  $\text{Y}^{4+}$  کدام است؟

۰/۳۹۶ (۱)

۰/۶۴ (۳)

۰/۶۲۴ (۲)

۰/۷۸ (۴)

۴۶

نکته

تعداد الکترون‌ها (e) در یک گونه را می‌توان از رابطه مقابل به دست آورد:

گام اول: مقدار عدد اتمی (Z) و عدد جرمی (A) در یون‌های  $\text{Y}^{4+}$  و  $\text{Y}^{4+}$  برابر است و یون‌های مربوط به یک عنصر فقط در

تعداد الکترون‌ها متفاوت هستند؛ بنابراین می‌توان نوشت:

$$A = 2/5Z + 2 \Rightarrow n + p = 2/5p + 2 \Rightarrow n = 1/5p + 2 \quad \text{رابطه (I)}$$

گام دوم: در یون  $\text{Y}^{4+}$ ، مجموع ذرات زیراتمی برابر با ۲۸۷ است؛ بنابراین داریم:

$$\text{Y}^{4+} \Rightarrow n + p + e = 287 \xrightarrow{e=p-2} n + p + p - 2 = 287 \Rightarrow n + 2p = 289 \quad \text{رابطه (II)}$$

گام سوم: با ادغام روابط (I) و (II)، می‌توان عدد اتمی (تعداد پروتون‌ها) را به دست آورد:

$$1/5p + 2 = 289 - 2p \Rightarrow 3/5p = 287 \Rightarrow p = 82$$

با قراردادن شمار پروتون‌ها در رابطه (I)، شمار نوترون‌ها نیز محاسبه می‌شود:

$$n = 1/5p + 2 \Rightarrow n = (1/5 \times 82) + 2 = 125$$

گام چهارم: در یون  $\text{Y}^{4+}_{82}$ ، شمار نوترون‌ها برابر ۱۲۵ و شمار الکترون‌ها برابر با ۷۸ است، بنابراین نسبت خواسته شده برابر است با:

$$\frac{\text{Y}^{4+}}{\text{Y}^{4+}} = \frac{\text{شمار الکترون‌هادر}}{\text{شمار نوترون‌هادر}} = \frac{78}{125} = 0/624$$



کدام بک از موارد زیر، درباره ایزوتوپ‌های ساختگی هیدروژن درست است؟



- (۱) سبک‌ترین آن‌ها، نیم عمری در حدود ۱۲ سال دارد.
- (۲) ناپایدارترین آن‌ها، در هسته خود ۷ نوترون دارد.
- (۳) با افزایش شمار نوترون‌های آن‌ها، نیم عمر آن‌ها به طور منظم کاهش می‌یابد.
- (۴) در همه آن‌ها، نسبت عدد جرمی به عدد اتمی بزرگ‌تر از ۳ است.

۴۶

**مشاوره** نکات و ویژگی‌های ایزوتوپ‌های مختلف هیدروژن، یکی از مهم‌ترین مباحث فصل اول است. در سوال‌های مربوط به این قسمت به طبعی یا ساختگی بودن، پایدار یا ناپایدار بودن و ترتیب نیم عمر این ایزوتوپ‌ها خلیلی دقت کنید.


### ایزوتوپ‌های هیدروژن

هیدروژن دارای ۷ ایزوتوپ به شرح زیر است:

نماد ایزوتوپ ویژگی ایزوتوپ	${}^1\text{H}$	${}^2\text{H}$	${}^3\text{H}$	${}^4\text{H}$	${}^5\text{H}$	${}^6\text{H}$	${}^7\text{H}$
نیم عمر	پایدار	پایدار	۱۲/۳۲ سال	$1/4 \times 10^{-22}$ ثانیه	$9/1 \times 10^{-22}$ ثانیه	$2/9 \times 10^{-22}$ ثانیه	$2/3 \times 10^{-22}$ ثانیه
درصد فراوانی در طبیعت	۹۹/۹۸۸۵	۰/۰۱۱۴	ناچیز	° (ساختگی)	° (ساختگی)	° (ساختگی)	° (ساختگی)

طبیعی

ساختگی



: مقایسه پایداری ایزوتوپ‌های هیدروژن

نسبت A (عدد جرمی) به Z (عدد اتمی) در ایزوتوپ‌های ساختگی هیدروژن به صورت زیر است:

$${}^1\text{H} \Rightarrow \frac{A}{Z} = 1, \quad {}^2\text{H} \Rightarrow \frac{A}{Z} = 2, \quad {}^3\text{H} \Rightarrow \frac{A}{Z} = 3, \quad {}^4\text{H} \Rightarrow \frac{A}{Z} = 4$$

در همه ایزوتوپ‌های ساختگی هیدروژن، نسبت  $\frac{A}{Z}$  بزرگ‌تر از ۳ است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه (۱): سبک‌ترین رادیوایزوتوپ ساختگی هیدروژن،  ${}^1\text{H}$  است که نیم عمر آن در حدود  $10^{-22}$  ثانیه است. دقت کنید که  ${}^1\text{H}$

رادیوایزوتوپ طبیعی هیدروژن است و نیم عمر آن، ۱۲/۳ سال است.

گزینه (۲): ناپایدارترین ایزوتوپ هیدروژن،  ${}^7\text{H}$  بوده که ۶ نوترون در هسته خود دارد.

گزینه (۳): ترتیب پایداری و نیم عمر ایزوتوپ‌های ساختگی هیدروژن به صورت منظم نیست.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید،  ${}^1\text{H} > {}^2\text{H} > {}^3\text{H} > {}^4\text{H}$  : مقایسه پایداری ایزوتوپ‌های ساختگی هیدروژن

را داشته و ناپایدارتر است.

۴۷

### چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ (نماد اتم‌های نیتروژن و اکسیژن به ترتیب به صورت $\text{N}^{+4}$ و $\text{O}^{-8}$ است.)

- در دود سیگار و قلیان، مقدار بسیار کمی مواد پرتوزا وجود دارد که ممکن است خطرناک باشند.
  - پاسخ به پرسش «جهان کنونی چگونه شکل گرفته است؟» در قلمرو علوم تجربی نمی‌گنجد.
  - در هر واحد از یون  $\text{NO}_2^-$ ، در مجموع ۶۳ ذره زیراتمی باردار وجود دارد.
  - از مواد پرتوزا می‌توان در پزشکی استفاده کرد ولی نمی‌توان از آن‌ها در تولید انرژی الکتریکی بهره گرفت.
- ۱ (۱)  
 ۲ (۲)  
 ۳ (۳)  
 ۴ (۴)

**مشاوره** در بعضی از سوالات موردی کنکور، عبارت‌های محاسباتی مثل عبارت سوم این سؤال وجود دارد. توصیه می‌آیم این است که ابتدا بقیه موارد را بخوانید و از درستی و نادرستی آن‌ها اطمینان حاصل کنید. در این سؤال، عبارت‌های اول، دوم و چهارم نادرست‌اند. در نتیجه، یکی از عبارات باید درست باشد. بدون انجام محاسبه و بدون این که عبارت سوم را بخوانید، سؤال حل می‌شود.

### پاسخ خیلی تشریحی ✓

فقط مورد سوم درست است.

بررسی عبارت‌ها:

عبارت اول: دود سیگار و قلیان، مقدار قابل توجهی (نه کمی) مواد پرتوزا دارد. از این‌رو اغلب افرادی که به سلطان ریه دچار می‌شوند، سیگاری هستند.

عبارت دوم:

پرسشی بسیار بزرگ و بنیادی است.

- (۱) هستی چگونه پدید آمده است؟
- پاسخ آن در قلمرو علوم تجربی (مانند فیزیک و شیمی) نمی‌گنجد.
- پاسخ آن در چارچوب اعتقادی و آموزه‌های الهی قرار دارد.
- پرسش‌های مهم
- (۲) جهان کنونی چگونه شکل گرفته است؟
- پاسخ آن‌ها در قلمرو علوم تجربی قرار دارد.
- (۳) پدیده‌های طبیعی چرا و چگونه رخ می‌دهند؟

عبارت سوم:

در یون‌های چنداتمی (یونی که بیشتر از یک اتم دارد مانند  $\text{SO}_3^-$ )، تعداد کل الکترون‌ها را می‌توان از رابطه زیر به دست آورد:

(مقدار بار را با علامت در رابطه قرار می‌دهیم).

بار - مجموع تعداد پروتون‌های اتم‌ها = تعداد الکترون‌های یون چنداتمی

تعداد پروتون‌ها را در یون  $\text{NO}_2^-$  محاسبه می‌کنیم:

$$\begin{aligned} {}^{+4}\text{N} &\Rightarrow p = 7 \\ {}^{-8}\text{O} &\Rightarrow p = 8 \end{aligned} \Rightarrow \text{NO}_2^- \Rightarrow \text{تعداد پروتون‌ها در } \text{NO}_2^- = \underbrace{(1 \times 7)}_{\text{N}} + \underbrace{(3 \times 8)}_{\text{O}} = 31$$


تعداد الکترون‌ها در این یون، یک عدد بیشتر از پروتون‌ها بوده و برابر ۳۲ است.

$$e = p - = 31 - (-1) = 32 \Rightarrow \text{ذرات باردار} \Rightarrow e + p = 31 + 32 = 63$$

عبارت چهارم: یکی از کاربردهای مواد پرتوزا، استفاده از آن‌ها در تولید انرژی الکتریکی است.



با توجه به جدول زیر، هر یک از توضیحات زیر را به ترتیب به کدام عنصرها می‌توان نسبت داد؟ (نماد عنصرها فرضی است).

**۴۸**


• تفاوت شماره دوره و گروه آن در جدول برابر ۱۲ است.

• تفاوت عدد اتمی آن با تعداد کل عنصرهای شناخته شده، برابر با تعداد عنصرهای طبیعی است.

• با عنصری که اتم آن ۱۶ الکترون دارد، خواص شیمیایی مشابهی دارد.

**۹۲**

X, A, D (۲)

E, A, X (۱)

A, E, D (۴)

E, D, X (۳)

با توجه به جداول، به راحتی می‌توان عدد اتمی و شماره دوره و گروه عنصرها را پیدا کرد.

**پاسخ خیلی تشریحی ✓**

E	D	X	A	عنصر
۸	۱۵	۶	۲۶	عدد اتمی
۲	۳	۲	۴	شماره دوره
۱۶	۱۵	۱۴	۸	شماره گروه

① تفاوت شماره دوره و گروه برای دو عنصر X و D برابر ۱۲ است.

② تاکنون، ۱۱۸ عنصر شناخته شده که ۹۲ تای آن‌ها طبیعی و ۲۶ تای آن‌ها، ساختگی است.

$$118 - 92 = 26 \Rightarrow A$$

③ می‌دانیم که عنصرهای هم‌گروه، خواص شیمیایی مشابهی دارند. عنصری با عدد اتمی ۱۶ مانند عنصر E<sub>۸</sub>، به گروه ۱۶ جدول تعلق دارد.

**۴۹**

در نمونه‌ای ۵۰۰ اتمی شامل ایزوتوپ‌های طبیعی منیزیم ( $^{24}\text{Mg}$ )، شمار نوترون‌ها، ۱۵۵ واحد بیشتر از شمار پروتون‌ها است. اگر درصد فراوانی سبک‌ترین ایزوتوپ در این نمونه برابر ۸۰٪ باشد، درصد فراوانی سنگین‌ترین ایزوتوپ کدام است؟

۱۲ (۴)

۱۱ (۳)

۱۰ (۲)

۹ (۱)

۴۹



درصد فراوانی یک ایزوتوپ در طبیعت از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\frac{\text{تعداد ایزوتوپ}}{\text{تعداد کل اتم‌هادر نمونه}} = \frac{x}{500} \times 100$$

گام اول: منیزیم در طبیعت به صورت ایزوتوپ‌های  $^{24}\text{Mg}$ ,  $^{25}\text{Mg}$  و  $^{26}\text{Mg}$  یافت می‌شود. طبق فرض سؤال، فراوانی ایزوتوپ  $^{24}\text{Mg}$  (سبک‌تر) در نمونه برابر ۸۰٪ است؛ در نتیجه، در نمونه ۵۰۰ اتمی از منیزیم، تعداد اتم‌های  $^{24}\text{Mg}$  برابر است با:

$$\frac{\text{تعداد ایزوتوپ}}{\text{تعداد کل اتم‌هادر نمونه}} = \frac{x}{500} \times 100 \Rightarrow x = \frac{80}{100} \times 500 \Rightarrow x = 400$$

گام دوم: ایزوتوپ‌های یک عنصر در تعداد نوترون‌ها با همدیگر تفاوت دارند ولی تعداد پروتون‌ها در آن‌ها برابر است؛ بنابراین تعداد پروتون‌ها در نمونه ۵۰۰ اتمی از منیزیم را به دست می‌آوریم:

$$\text{تعداد پروتون‌ها در نمونه} = 500 \times 12 = 6000$$

با توجه به این‌که تعداد نوترون‌ها، ۱۵۵ واحد بیشتر از تعداد پروتون‌ها است، می‌توان نوشت:

$$\text{تعداد نوترون‌ها در نمونه} = 6000 + 155 = 6155$$

گام سوم: از ۵۰۰ اتم منیزیم، ۴۰۰ اتم  $^{24}\text{Mg}$  است؛ در نتیجه مجموع اتم‌های  $^{25}\text{Mg}$  و  $^{26}\text{Mg}$  برابر ۱۰۰ اتم است. اگر تعداد اتم‌های  $^{25}\text{Mg}$  را برابر با  $x$  و تعداد اتم‌های  $^{26}\text{Mg}$  را برابر با  $y$  در نظر بگیریم، می‌توان نوشت:

$$x + y = 100$$

از طرفی تعداد نوترون‌های  $^{25}\text{Mg}$  برابر  $13x$  و تعداد نوترون‌های  $^{26}\text{Mg}$  برابر با  $14y$  خواهد بود. اکنون با حل دستگاه زیر، مقادیر  $x$  و  $y$  را محاسبه می‌کنیم:

$$\text{تعداد ایزوتوپ‌های } ^{25}\text{Mg} \text{ و } ^{26}\text{Mg} \Rightarrow x + y = 100$$

$$\text{تعداد کل نوترون‌ها در نمونه} \Rightarrow \underbrace{(12 \times 400)}_{^{24}\text{Mg}} + \underbrace{13x}_{^{25}\text{Mg}} + \underbrace{14y}_{^{26}\text{Mg}} = 6155 \Rightarrow 13x + 14y = 1355$$

با حل دو معادله - دو مجهول،  $x$  و  $y$  مشخص می‌شوند. اگر معادله اول را در ۱۳ ضرب می‌کنیم، خواهیم داشت:

$$\begin{cases} 13x + 13y = 1300 \\ 13x + 14y = 1355 \end{cases} \Rightarrow y = 55 \quad (\text{تعداد اتم‌های } ^{26}\text{Mg})$$

کام چهارم: درصد فراوانی ایزوتوپ  $^{26}\text{Mg}$  برابر است با:

$$\frac{\text{تعداد اتم‌های } ^{26}\text{Mg}}{\text{تعداد کل اتم‌هادر نمونه}} \times 100 = \frac{55}{500} \times 100 = 11\%$$

**نکته**

### پاسخ خیلی تشریحی ✓

۵۰



اگر تفاوت شمار نوترون‌ها و الکترون‌ها در یون  $X^{3+}$  برابر ۲۸ باشد، کدام اتم را می‌توان ایزوتوپ اتم X در نظر گرفت؟

$$^{139}_{56}D \quad (2)$$

$$^{142}_{56}E \quad (4)$$

$$^{140}_{54}A \quad (1)$$

$$^{141}_{57}M \quad (3)$$

۵۰

- به تعداد پروتون‌های هسته اتم هر عنصر، عدد اتمی آن عنصر گفته می‌شود. عدد اتمی (Z) هر عنصر، منحصر به فرد است و به کمک عدد اتمی، نوع عنصر را تعیین می‌کنند.

- به مجموع تعداد پروتون‌ها و نوترون‌های یک اتم، عدد جرمی گفته می‌شود.



- اتم، ذره‌ای خنثی است؛ بنابراین تعداد پروتون‌های یک اتم (Z) با تعداد الکترون‌های آن (e) برابر است.

- اتم‌ها با از دست دادن یا گرفتن الکترون به ذره‌های بارداری به نام یون شوند. در تبدیل اتم‌ها به یون، هسته اتم دستخوش تغییر نمی‌شود؛ بنابراین عدد اتمی و عدد جرمی در اتم‌ها و یون‌های مربوط به آن‌ها، هیچ فرقی با هم نمی‌کند.

- در مبحث عدد جرمی، مسائلی داریم که در آن عدد جرمی (مجموع شمار پروتون‌ها و نوترون‌ها) و تفاوت شمار نوترون‌ها و پروتون‌ها داده می‌شود. برای پاسخ‌دادن به این سوال‌ها می‌توان از فرمول زیر استفاده کرد:

$$(A) - (n-p) = \frac{\text{عدد جرمی}}{\text{عدد اتمی}} = \frac{(A)}{(Z)}$$

- در مبحث عدد جرمی، مسائلی داریم که در آن عدد جرمی (مجموع شمار پروتون‌ها و نوترون‌ها) و تفاوت شمار نوترون‌ها و الکترون‌ها داده می‌شود. برای پاسخ‌دادن به این سوال‌ها از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

$$(A) - (n-e) + (n-p) = \frac{\text{بار یون با علامت}}{2} = \frac{\text{عدد جرمی}}{\text{عدد اتمی}} = \frac{(A)}{(Z)}$$

- توجه: در ۴ یون  $O^{2-}$ ،  $S^{2-}$ ،  $N^{3-}$  و  $P^{3-}$  تعداد الکترون‌ها از نوترون‌ها بیشتر است؛ بنابراین عبارت  $(n-e)$  عددی منفی خواهد بود.

### درس Box

ابتدا باید عدد اتمی عنصر X را حساب کنیم: ✓ پاسخ خیلی تشریحی

طبق فرض سوال، اختلاف شمار نوترون‌ها و الکترون‌ها برابر با ۲۸ شده است؛ لذا می‌توان نوشت:

$$n - e = 28 \xrightarrow{e=p-3} n - (p-3) = 28 \Rightarrow n - p + 3 = 28 \Rightarrow n - p = 25$$

اکنون با حل دستگاه زیر، مقادیر n و p به دست می‌آید:

$$\begin{cases} n + p = 139 \\ n - p = 25 \end{cases} \Rightarrow n = 82, p = 57$$

عدد اتمی  $E^{3+}$  برابر است با: يه جور دیگه

$$(A) - (N-e) + (n-p) = \frac{\text{بار یون با علامت}}{2} = \frac{(A)}{2} \Rightarrow Z = \frac{139 - 82 + 3}{2} = 57$$

- عدد اتمی عنصر M نیز برابر ۵۷ است و با عنصر X ایزوتوپ است. (ایزوتوپ‌های یک عنصر، عدد اتمی یکسان و عدد جرمی متفاوت دارند).

ست؟

1

- اختلاف تعداد دوره و گروه در جدول تناوبی، برابر با ۹ است.

<sup>۲۳۵</sup> فر اوان ترین این و توب اورانیم، U است که به عنوان سوخت در راکتورهای اتمی استفاده می شود.

با وجود پیشرفت در علم شیمی و فیزیک، انسان هنوز نمی‌تواند عنصرهای دیگر را به طلا تبدیل کند.

(۲) درست - نادرست - نادرست - نادرست

نادرست - درست - نادرست (۴)

۱۴) نادرست - درست - درست - درست

۱) نادرست - نادرست - درست - درست

پاسخ خیلی تشریحی ✓

سیارات اول: درست - در اینان، رادیوایزوتوپ‌هایی، از جمله تکنسیم و فسفر تولید می‌شود.

نادرست - جدول، تناوبی، از ۱۸ گروه و ۷ دوره تشکیل شده است، بنابراین اختلاف شماره ۵۰، ۵۱ و ۵۲، آن برابر با ۱۱ است.

سیار سوم: نادرست - درصد فراوانی  $U^{235}$  در مخلوط طبیعی، از اورانیم، کمتر از ٧٪ درصد است.

نه سای انواعی، افراش مقدار (فراوان) یک انواعی است، مخلوط انواعی های آن عنصر  $\leftarrow$  مثلاً: افراش، فراوانی،

<sup>۲۳۵</sup>U در مخلوط ایزوتوپ‌های اورانیم بیزوتوپ

- کیمیاگری (تبدیل عنصرهای دیگر به طلا) آرزوی دیرینه بشر بوده است. با پیشرفت علم شیمی و فیزیک،

بسان می‌تواند طلا تولید کند، اما هزینهٔ تولید آن به اندازه‌ای زیاد است که صرفهٔ اقتصادی ندارد.

نکته



۵۲

اگر اتم مربوط به عنصر  $E$  و یک رادیوایزوتوپ باشد، حداقل شمار نوترون‌ها در هسته هر اتم از آن برابر با ..... بوده و نسبت عدد

$$\frac{n}{p} \geq 1/5$$

جرمی آن به مقدار  $\frac{A-Z}{Z}$  در اتم  $X_{72}$  برابر با ..... است.

(۱)  $190 - 144$ (۲)  $192 - 144$ (۳)  $190 - 146$ (۴)  $192 - 146$ 

- (۱) رادیوایزوتوپ‌ها، دسته‌ای از ایزوتوپ‌های یک عنصر هستند که ناپایدار و پرتوزا بوده و دارای نیم‌عمرند، یعنی با گذشت زمان هسته آن‌ها متلاشی می‌شود.

- (۲) اغلب هسته‌هایی که  $1/5 \geq \frac{n}{p} \geq 1/2$  دارند، رادیوایزوتوپ هستند و به مرور زمان متلاشی می‌شوند.

در اغلب رادیوایزوتوپ‌ها، حداقل شمار نوترون‌ها،  $1/5$  برابر شمار پروتون‌ها است؛ بنابراین می‌توان نوشت:

$$n = 1/\Delta p \Rightarrow n = 1/5 \times (96) = 144$$

بر این اساس، نماد عنصر  $E$  به صورت زیر است:

$$E_Z^A \Rightarrow E_{p+5}^{n+p} \Rightarrow E_{144+96}^{144+96} \Rightarrow E_{96}^{240}$$

در اتم  $X_{72}$  مقدار  $\frac{A-Z}{Z}$  برابر است با:

$$\frac{A-Z}{Z} \Rightarrow \frac{72-32}{32} = \frac{40}{32} = \frac{5}{4}$$

نسبت خواسته شده در قسمت دوم سؤال نیز برابر است با:

$$\frac{240}{5} = \frac{4 \times 240}{5} = 192$$

درس Box

۵۳



با دانستن موقعیت یک عنصر در جدول دوره‌ای، کدام مورد را درباره آن عنصر نمی‌توان به دست آورد؟

۵۳

- (۱) شمار الکترون‌ها
- (۲) عدد اتمی
- (۳) شمار نوترون‌ها
- (۴) شماره دوره


از طریق عدد اتمی می‌توان شماره دوره و گروه هر عنصر را تشخیص داد. همچنین در هر خانه از جدول تناوبی، عدد اتمی عنصر ذکر شده است که نشان‌دهنده شمار پروتون‌ها و الکترون‌ها است، اما در این خانه‌ها، عدد جرمی اتم نوشته نمی‌شود، در نتیجه نمی‌توان تعداد نوترون‌ها در اتم را محاسبه کرد. جرم اتمی میانگین، کمیتی است که در خانه‌های جدول تناوبی نوشته می‌شود. برای نمونه، خانه مربوط به اتم هیدروژن در جدول دوره‌ای به صورت شکل زیر است:

پاسخ خیلی تشریحی ✓

عدد اتمی	۱
نماد شیمیایی	H
نام	هیدروژن
جرم اتمی میانگین	۱/۰۰۸

۵۴

با توجه به شکل مقابل، چند مورد از عبارت‌های زیر درست است؟ ۵۴



**مشاوره** یکی از منابع اصلی طرح سوالات در کنکور، مطالب و شکل‌های کتاب درسی است. پس بر شما واجبه که بر همه شکل‌ها و متن‌های کتاب درسی، تسلط کافی داشته باشید.

- b. یک توده سرطانی را نشان می‌دهد که در اطراف آن، مواد c و d تجمع می‌یابند.
- c. نشان‌دهنده گلوکز نشان دار بوده و قادر اتم پرتوزا است.
- با فرایند انجام گرفته در شکل، توده سرطانی را می‌توان درمان کرد.
- قسمت a، آشکارساز پرتو بوده و پرتوهای گسیل شده از d و c را جذب می‌کند.

۴ (۴)


۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

با توجه به شکل زیر، هر یک از موارد a، b، c، d به ترتیب نشان‌دهنده آشکارساز پرتو، توده سرطانی، گلوکز نشان دار و گلوکز معمولی هستند. بر این اساس فقط عبارت اول درست است.

جمع گلوکز معمولی و گلولز حاوی اتم پرتوزا در توده سرطانی



بررسی عبارت‌ها:

عبارت اول: b، نشان‌دهنده یک توده سرطانی است. با تزریق گلوکز نشان دار به بدن، هم گلوکز معمولی و هم گلوکز پرتوزا در محل توده سرطانی تجمع می‌یابند.

عبارت دوم: c، نشان‌دهنده گلوکز نشان دار بوده و حاوی اتم پرتوزا است. به گلوکز حاوی اتم پرتوزا، گلوکز نشان دار گفته می‌شود.

عبارت سوم: فرایند انجام گرفته در شکل فقط برای شناسایی محل توده سرطانی به کار می‌رود. این فرایند ربطی به درمان مستقیم بیماری ندارد.

عبارت چهارم: قسمت a، نشان‌دهنده آشکارساز پرتو است و پرتوهای گسیل شده از گلوکز نشان دار را جذب می‌کند.

دقت کنید که گلوکز معمولی، پرتوزا نیست و هیچ پرتویی را از خود گسیل نمی‌کند تا توسط آشکارساز جذب شود.

**گول‌نخوری**

۵۵

شکل زیر، برخی از عناصر جدول تناوبی را نشان می‌دهد. کدام‌بک از عبارت‌های زیر در رابطه با این عناصر نادرست است؟

**۵۵**

(نماد عناصر فرضی است).

A		M	L	X	
B			D		
				E	

(۱) تفاوت عدد اتمی دو عنصر A و B برابر با تعداد پروتون‌ها در اتم X است.

(۲) اگر L تبدیل به یون  $-L^3$  شود، عنصر D نیز با از دست دادن الکترون به  $-D^3$  تبدیل می‌شود.

الکترون و پروتون

(۳) مجموع شمار ذرهای زیراتمی باردار در اتم E برابر با ۲۳۶ است.

(۴) در اتم  $M^{27}$ ، ۱۴ نوترون وجود دارد.

L و D هر دو در گروه ۱۵ جدول تناوبی جای دارند. اگر L تبدیل به یون  $-L^3$  شود، D نیز به یون  $-D^3$  تبدیل می‌شود، اما

مشکل این جاست که اتم، زمانی تبدیل به آنیون (یون منفی) می‌شود که الکترون بگیرید نه این که الکترون از دست دهد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه (۱): تفاوت عدد اتمی دو عنصر  $A_{19}$  و  $B_{11}$  برابر با ۸ بوده و عدد اتمی (شمار پروتون‌ها) در عنصر X نیز برابر با ۸ است.

گزینه (۳): اتم E، آخرین عنصر جدول دوره‌ای است. می‌دانیم که در جدول، ۱۱۸ عنصر وجود دارد؛ بنابراین عدد اتمی این عنصر برابر ۱۱۸ بوده و در هر اتم از آن، ۱۱۸ پروتون و ۱۱۸ الکترون وجود دارد. مجموع ذرات زیراتمی باردار در این اتم برابر ۲۳۶ است. (نوترون‌ها، فاقد بار الکتریکی هستند).

گزینه (۴): عدد اتمی M برابر با ۱۳ است؛ بنابراین در اتم  $M^{27}$ ،  $27 - 13 = 14$  نوترون وجود دارد.

### پاسخ خیلی تشریحی ✓



درستی یا نادرستی کدام گزینه با دیگر گزینه‌ها متفاوت است؟

۵۶

- (۱) جدول دوره‌ای امروزی براساس افزایش جرم اتمی عنصرها مرتب شده است.
- (۲) پسماند راکتورهای اتمی، خطرناک نیست و خاصیت پرتوزایی ندارد.
- (۳) گاز اکسیژن ( $O_2$ ) را برخلاف هلیم ( $He$ )، نمی‌توان عنصر در نظر گرفت.
- (۴) هنگام عکسبرداری از دندان‌ها در رادیولوژی، با پوشش‌های سربی از غده تیروئید محافظت می‌شود.

۵۷

## پاسخ خیلی تشریحی ✓

گزینه (۴) درست است و بقیه گزینه‌ها نادرست هستند. می‌دانیم که هنگام عکسبرداری از دندان‌ها در رادیولوژی باید با استفاده از پوشش‌های سربی از غده تیروئید در برابر پرتوهای پرانرژی و خطرناک محافظت کرد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه (۱): عناصر در جدول تناوبی امروزی براساس افزایش عدد اتمی ( $Z$ ) چیده شده‌اند.

گزینه (۲): پسماند راکتورهای اتمی هنوز خاصیت پرتوزایی دارد و خطرناک است؛ از این‌رو دفع آن‌ها از جمله چالش‌های صنایع هسته‌ای به شمار می‌آید.

گزینه (۳): عنصر شکل خالصی از ماده‌است که از یک نوع اتم تشکیل شده‌است. عنصرهای توانند تکا اتمی ( $He$ ، دو اتمی ( $O_2$ ))، چند اتمی (مانند  $P_4$ ) و یا به صورت شمار سیار زیادی از اتم‌های یکسان که کنار هم قرار گرفته‌اند (مانند  $Mg$ )، باشند.

۵۷



کدام بک از موارد زیر در رابطه با عنصر تکنسیم درست است؟

۵۷

(۱) شناخته شده ترین فلز پرتوزا است و در تصویربرداری پزشکی کاربرد دارد.

(۲) نماد این عنصر به صورت  $^{99}\text{TC}$  بوده و نسبت  $\frac{n}{p}$  در آن بیشتر از این نسبت در  $^3\text{H}$  است.

(۳) غده تیروئید به همراه جذب یون یدید، یون تکنسیم را نیز جذب می کند.

(۴) در واکنشی که تکنسیم توسط آن تولید می شود، همانند واکنش تبدیل هیدروژن به هلیم پس از مهیانگ، انرژی آزاد می شود.



### پاسخ خیلی تشریحی ✓

همه  $^{99}\text{TC}$  موجود در جهان باید به طور مصنوعی و با استفاده از واکنش های هسته ای ساخته شود. واکنش تبدیل هیدروژن به هلیم نیز، از نوع هسته ای است. در واکنش های هسته ای، انرژی آزاد می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه (۱): تکنسیم، نخستین عنصر ساخت بشر در راکتورهای هسته ای بوده و در تصویربرداری پزشکی کاربرد دارد.

شناخته شده ترین فلز پرتوزا، فلز اورانیم بوده و نخستین عنصر ساخت بشر، تکنسیم است.

### گول نخوری ✗

اغلب هسته هایی با  $\frac{n}{p} \geq 1/5$ ، ناپایدار بوده و رادیوایزوتوب به حساب می آیند، اما در تکنسیم ( $^{99}\text{TC}$ )، این نسبت کمتر از  $1/5$  است اما تکنسیم یک رادیوایزوتوب محسوب می شود:

### نکته

$^{99}\text{TC} \Rightarrow \frac{n}{p} = \frac{56}{43} \approx 1/3 < 1/5$  ولی رادیوایزوتوب است.

گزینه (۲): نسبت  $\frac{n}{p}$  تکنسیم به تقریب برابر  $1/3$  بوده و کمتر از این نسبت در  $^3\text{H}$  ( $\frac{2}{1} = 2$ ) است.

گزینه (۳): به دلیل اندازه مشابه یون یدید با یون حاوی تکنسیم (نه خود یون تکنسیم)، غده تیروئید همراه با جذب یون یدید، این یون را نیز جذب می کند و امکان تصویربرداری از غده فراهم می شود.

۵۸



چند مورد از ویژگی‌های زیر در ایزوتوپ‌های مربوط به یک عنصر، یکسان است؟

۵۸

• یکسان،  $Z^A$  متفاوت

• خواص شیمیایی

• چگالی

• نسبت شمار الکترون‌ها به پروتون‌ها

• نوترون و پروتون

• مجموع ذرات داخل هسته اتم

• جایگاه آن‌ها در جدول دوره‌ای

۵ (۴)

۴ (۳)

۳ (۲)

۲ (۱)

۱ (۰)

ایزوتوپ‌های یک عنصر در خواص فیزیکی وابسته به جرم مانند چگالی و نقطه جوش با هم متفاوت‌اند، اما از آن جایی که ایزوتوپ‌های مختلف یک عنصر، عدد اتمی ( $Z$ ) یکسانی دارند، در شمار پروتون‌ها، شمار الکترون‌ها و خواص شیمیایی یکسان هستند.

نکته

پاسخ خیلی تشریحی ✓

ایزوتوپ‌های یک عنصر، شمار پروتون‌ها و الکترون‌های یکسانی دارند و در نتیجه نسبت  $\frac{e}{p}$  آن‌ها برابر ۱ است. همچنین در تعداد نوترون‌ها متفاوت هستند و مجموع ذرات داخل هسته (پروتون و نوترون) در آن‌ها متفاوت است. ایزوتوپ‌های یک عنصر، فقط

یک جایگاه از جدول تناوبی را اشغال می‌کنند، چون خانه‌های جدول تناوبی براساس افزایش عدد اتمی مرتب می‌شوند نه افزایش عدد جرمی!

عنصر X دارای سه ایزوتوپ با جرم‌های سبک، متوسط و سنگین است؛ به طوری که با دریافت دو الکترون توسط هر اتم از ایزوتوپ سنگین‌تر، عدد جرمی این ایزوتوپ دو برابر تعداد الکترون‌های آن می‌شود. اگر به ازای ۲ ایزوتوپ سبک‌تر، ۴ ایزوتوپ سنگین‌تر و به ازای هر ایزوتوپ سبک‌تر، ۲ ایزوتوپ با جرم متوسط در نمونه X وجود داشته باشد، درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین‌تر کدام است و در

**۵۹**

$$\rightarrow F_3 = 2F_1$$

$$F_2 = 2F_1$$

به ازای هر ایزوتوپ سبک‌تر، ۲ ایزوتوپ با جرم متوسط در نمونه X وجود داشته باشد، درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین‌تر کدام است و در

۴ - ۵۰ (۲)

۵ - ۵۰ (۱)

۵ - ۴۰ (۴)

۴ - ۴۰ (۳)



**پاسخ خیلی تشریحی ✓** فرض کنیم که نماد ایزوتوپ‌های عنصر X به صورت زیر است:

$$\text{ایزوتوپ سبک‌تر} \Rightarrow A_1 X$$

$$\text{ایزوتوپ با جرم متوسط} \Rightarrow A_2 X$$

$$\text{ایزوتوپ سنگین‌تر} \Rightarrow A_3 X$$

اگر هر اتم از ایزوتوپ سنگین‌تر، ۲ الکترون دریافت کند، طبق فرض سؤال می‌توان نوشت:

$$A_3 X^{2-} \Rightarrow \frac{A_3}{e} = 2 \Rightarrow \frac{n+p}{e} = 2 \xrightarrow{e=p-2} \frac{n+p}{p+2} = 2 \Rightarrow 2p+4 = n+p \Rightarrow n-p = 4$$

اختلاف شمار نوترون‌ها و پروتون‌ها در ایزوتوپ سنگین‌تر برابر با ۴ است.

برای به دست آوردن فراوانی ایزوتوپ‌ها، با توجه به اطلاعات داده شده، می‌توان نوشت:

$$\begin{cases} F_3 = 2F_1 \\ F_2 = F_1 \end{cases} \xrightarrow{F_1+F_2+F_3=100} F_1 + 2F_1 + 2F_1 = 100$$

$$\Rightarrow \Delta F_1 = 100 \Rightarrow F_1 = 20 \xrightarrow{F_2=2F_1} F_2 = 40$$

**۶۰**



کدام مورد نادرست است؟

۶۰

- ۱) اطلاعاتی که توسط فضاییمایهای وویجر به زمین مخابره می‌شوند، می‌توانند شامل نوع عناصر سازنده سیاره‌ها باشند.
- ۲) با انجام واکنش‌های هسته‌ای درون ستاره‌ها، عناصر سبک‌تر به عناصر سنگین‌تر تبدیل می‌شوند.
- ۳) با کاهش دما پس از مهبانگ، عناصر سبک‌تر متراکم شدن و مجموعه‌هایی سنگی را پدید آورند.
- ۴) انرژی آزادشده در واکنش‌های هسته‌ای آنقدر زیاد است که می‌تواند صدها میلیون تن فولاد را ذوب کند.

### نکته

رونده تشکیل عناصر در کیهان را می‌توان به صورت نمودار زیر نمایش داد:



### پاسخ خیلی تشریحی ✓

با کاهش دما پس از مهبانگ، عناصر H و He متراکم شدن و مجموعه‌هایی گازی (نه سنگی!) به نام سحابی‌ها را پدید آورند.  
بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه (۱): فضاییمایهای وویجر ۱ و ۲ مأموریت داشتند با گذر از کنار سیاره‌های مشتری، زحل، اورانوس و نپتون، شناسنامه فیزیکی و شیمیایی آن‌ها را تهیه کنند و بفرستند. این شناسنامه‌ها می‌توانند حاوی اطلاعاتی مانند نوع عناصر سازنده، ترکیب‌های شیمیایی در اتمسفر آن‌ها و ترکیب درصد این مواد باشد.

گزینه (۲): درون ستاره‌ها، با انجام واکنش‌های هسته‌ای، عناصر سبک‌تر به عناصر سنگین‌تر تبدیل می‌شوند.  
گزینه (۴): کمالدرسته!

فرض کنید  $(-1, 3) = A$  و  $(1, 5) = B$  باشد، در این صورت مجموعه اعضايی که فقط متعلق به یکی از این دو مجموعه هستند، کدام است؟

یعنی از اجتماعشون، قسمت‌های مشترک رو  
 $(A \cup B) - (A \cap B)$  برداریم:

$$(-1, 1] \cup [3, 5)$$

$$(-1, 5) \quad (2)$$

$$(-1, 5) - \{1, 3\} \quad (3)$$

$$[3, 5) \quad (4)$$


مجموعه  $(A \cup B) - (A \cap B)$  را به دست آورید.

اگر  $A$  و  $B$  دو مجموعه دلخواه باشند، آن‌گاه مجموعه اعضايی که:

**Hint**
**درس Box**

$A - B$	فقط به $A$ تعلق دارند:
$B - A$	فقط به $B$ تعلق دارند:
$A \cup B$	به $A$ یا $B$ تعلق دارند:
$(A \cup B) - (A \cap B)$	به دقیقاً یکی از $A$ یا $B$ تعلق دارند:

پاسخ خیلی تشریحی ✓ گام اول: بهترین کار نمایش روی محور است:



گام دوم: در اصل قسمت‌هایی مد نظر ما هست که مشترک نیستند. طبق محور بالا این قسمت‌ها به صورت زیر هستند:

$$(-1, 1] \cup [3, 5)$$



اگر  $[a, b]$  شامل چند عضو است؟

۲ (۴)

۳ (۳)

۴ (۲)

۵ (۱)



اشتراک بازه‌ها را روی محور به دست آورید.

Hint

درس Box

بازه‌ها

چه طور نشانش می‌دهیم؟			چه طور خوانده می‌شود؟
مجموعه‌ای	هنگامی	بازه‌ای	
$\{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$		$(a, +\infty)$	بازه باز
$\{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$		$(-\infty, b)$	
$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$		$(a, b)$	
$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$		$[a, b]$	بازه بسته
$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$		$(a, b]$	
$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$		$[a, b)$	
$\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$		$[a, +\infty)$	بازه نیم‌باز
$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$		$(-\infty, b]$	



$$[a, b] = [5, 8]$$

گام اول: اشتراک دو بازه داده شده را به دست می‌آوریم:

گام دوم: پس  $a = 5$  و  $b = 8$  است. بنابراین مجموعه  $A$  به صورت زیر درمی‌آید:

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid 5 \leq x < 8\} = \{x \in \mathbb{N} \mid 5 \leq x < 8\}$$

گام سوم: اعداد طبیعی موجود در بازه  $5 \leq x < 8$  برابر ۵، ۶ و ۷ است که تعداد آن‌ها سه‌تا است.



فرض کنید  $a - 2 < 2a + 1$  است. حدود  $a$  کدام باشد تا  $2 \in A$  و  $3 \notin A$ ؟

$$[2, 3) \quad (2)$$

$$\left[\frac{1}{2}, 1\right) \quad (1)$$

$$\left[\frac{1}{2}, 5\right) \quad (4)$$

$$\left[\frac{1}{2}, 4\right) \quad (3)$$

کافی است  $a - 2 < 2a + 1$  را حل کنید و عدد ۳ را بیرون بازه نگه دارید.

منظور از بازه  $[m, n)$  همه اعداد حقیقی‌ای مانند  $x$  است که  $m \leq x < n$  است. بازه‌ها، مجموعه‌هایی نامتناهی هستند که هم

شامل اعداد گویا و هم اعداد گنگ هستند. در بازه  $[m, n)$  یا  $(m, n)$  یا ... یک شرط پنهان وجود دارد:  $m < n$ .

**Hint**

**دریس Box**

پاسخ خیلی تشریحی ✓

گام اول: نامعادله  $a - 2 < 2a + 1$  را حل می‌کنیم:

$$\begin{cases} a - 2 < 2 \\ 2 \leq 2a + 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a < 4 \\ \frac{1}{2} \leq a \end{cases} \xrightarrow{\text{اشتراک و یعنی}} a \in \left[\frac{1}{2}, 4\right) \quad (1)$$

برای حل این گونه نامعادلات، یک بار سمت راست و یک بار سمت چپ را حل می‌کنیم و بین جواب‌ها، اشتراک می‌گیریم:

$$\begin{array}{c} \text{سمت راست} \\ A < B < C \\ \text{سمت چپ} \end{array}$$

**نکته**


گام دوم: عدد ۳ را بیرون بازه نگه می‌داریم. یعنی داریم:

$$\begin{cases} 3 \leq a - 2 \\ 2a + 1 < 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 5 \leq a \\ a < 1 \end{cases} \xrightarrow{\text{ایا یعنی اجتماع}} a \in (-\infty, 1) \cup [5, +\infty) \quad (2)$$

گام سوم: شرط بازدیدون را فراموش نکنیم:

$$a - 2 < 2a + 1 \Rightarrow -3 < a \quad (3)$$

گام چهارم: از اشتراک (3) و (2) و (1) روی محور نتیجه می‌گیریم:



ناحیه مشترک  $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$  است.

حدود  $a$  کدام باشد تا  $(a - 1, 3a) \subseteq [6, 2a + 8]$  باشد؟

[5, 6] (۲)

[6, 9] (۱)

[7, 8] (۴)

(5, 9] (۳)



درسی Box

شرط این که  $[c, d] \subseteq (c, d)$  باشد، این است که:

$$\begin{cases} c \leq m \\ \text{و} \\ d \geq n \end{cases}$$

به عنوان مثال  $[1, 6] \subseteq (3, 5)$  است.اما اگر بازه سمت چپ بسته باشد، کمی شرایط تغییر می‌کند؛ مثلاً شرط  $[m, n] \subseteq (c, d)$  این است که:

$$\begin{cases} c < m \\ \text{و} \\ d > n \end{cases}$$

پاسخ خیلی تشریحی ✓ گام اول: شرط بازه‌بودن را بررسی می‌کنیم:

$$\begin{cases} a - 1 < 3a \\ \text{و} \\ 6 < 2a + 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\frac{1}{2} < a \\ \text{و} \\ -1 < a \end{cases} \Rightarrow a \in (-\frac{1}{2}, +\infty) \quad (*)$$

گام دوم: بنا به درس‌یاکس بالا داریم:

$$\begin{cases} 6 \leq a - 1 \\ \text{و} \\ 2a + 8 \geq 3a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 7 \leq a \\ \text{و} \\ a \leq 8 \end{cases} \xrightarrow{\text{و»} \text{یعنی اشتراک}} a \in [7, 8] \quad (**)$$

از (\*) و (\*\*) اشتراک می‌گیریم و به جواب  $a \in [7, 8]$  می‌رسیم.



$(A_4 - A_1)$  باشد. آنگاه تعداد اعضای  $A_n = \{m \in \mathbb{Z} \mid n^2 - 1 < m < 3^n + 2^n + 1\}$  چندتا از تعداد اعضای  $(A_4 - A_1)$  بیشتر است؟

۴۸ (۴)

۵۴ (۳)

۶۲ (۲)

۶۸ (۱)

۶۵

۶۶

برای به دست آوردن  $\dots, A_1, A_2, \dots, A_n$  باید جای  $n$ .اعداد  $1, 2, \dots, n$  را قرار دهید.

تعداد عناصر مجموعه  $\{a, a+1, a+2, \dots, b\}$  برابر با  $b-a+1$  است.

گام اول:  $A_1, A_2, A_3$  و  $A_4$  را نیاز داریم، پس همه را به دست می‌آوریم:

$$A_1 = \{m \in \mathbb{Z} \mid 0 < m < 6\} = \{1, 2, \dots, 5\}$$

$$A_2 = \{m \in \mathbb{Z} \mid 3 < m < 12\} = \{4, 5, \dots, 11\}$$

$$A_3 = \{m \in \mathbb{Z} \mid 6 < m < 36\} = \{7, 8, \dots, 35\}$$

$$A_4 = \{m \in \mathbb{Z} \mid 15 < m < 98\} = \{16, 17, \dots, 97\}$$

گام دوم:  $(A_4 - A_1)$  و  $(A_4 - A_2)$  را تشکیل می‌دهیم:

$$A_4 - A_1 = \{6, 7, \dots, 13\} \Rightarrow n(A_4 - A_1) = 13 - 6 + 1 = 8$$

$$A_4 - A_2 = \{36, 37, \dots, 97\} \Rightarrow n(A_4 - A_2) = 97 - 36 + 1 = 62$$

بنابراین اختلاف مورد نظر  $54 - 8 = 46$  است.

Hint

نکته

پاسخ خیلی تشریحی ✓

۶۶



اگر  $\{1, 2, 3, \dots, 10\}$  باشد. آن گاه کدام یک از اعداد  $C = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$  و  $B = \{3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\}$ .  $A = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$  زیر به  $(A - B) \cup (B - C)$  تعلق ندارد؟

۱۵ (۴)

۹ (۳)

۸ (۲)

۶ (۱)

۶۶



۶۷

**پاسخ خیلی تشریحی ✓** گام اول: ابتدا  $(A - B)$  و  $(B - C)$  را می‌نویسیم:

$$A - B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\} - \{3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\} = \{1, 2, 4, 6, 8, 10\}$$

$$B - C = \{3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\} - \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\} = \{3, 13, 15\}$$

گام دوم: حالا اجتماع اعضای  $(A - B)$  و  $(B - C)$  را می‌نویسیم:

$$(A - B) \cup (B - C) = \{1, 2, 4, 6, 8, 10\} \cup \{3, 13, 15\} = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 15\}$$

که ۹ عضو این مجموعه نیست.



مجموعه  $(A' - B) \cap (A - B')$  با کدام یک از مجموعه‌های زیر همواره برابر است؟

A (۲)

 $A' - B'$  (۱) $A - B'$  (۴) $A - B$  (۳)

از داخلی‌ترین پرانتزها، شروع به ساده‌کردن کنید.

مجموعه مرجع و متمم یک مجموعه




Hint

درین Box

مجموعه مرجع: مجموعه‌ای که تمام مجموعه‌های مورد بحث (در سؤال) در آن تعریف می‌شوند، مجموعه مرجع نام دارد. معمولاً آن را با  $U$  (یا  $M$ ) نشان می‌دهیم.

متتم مجموعه  $A$ : شامل تمام عضوهای مجموعه مرجع است که در خود  $A$  نیستند و آن را با  $A'$  نشان می‌دهیم.



قوانين دمورگان در حل این نوع تست‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند:

۱)  $(A \cup B)' = A' \cap B'$

۲)  $(A \cap B)' = A' \cup B'$

علاوه بر آن، سه قانون مهم دیگر عبارت‌اند از:

۳)  $(A')' = A$

۴)  $A - B = A - (A \cap B)$

۵)  $A - B = A \cap B'$

گام اول: از پرانتز سمت چپ شروع می‌کنیم: پاسخ خوبی تشریحی ✓

$$\left. \begin{array}{l} A' - B \xrightarrow[\text{درس باکس}]{{\text{طبقه مورد}} ۵} A' \cap B' \xrightarrow[\text{درس باکس}]{{\text{طبقه مورد}} ۱} (A \cup B)' \\ A - B' \xrightarrow[\text{درس باکس}]{{\text{طبقه مورد}} ۵} A \cap B \end{array} \right\} \text{:(اشتراک می‌گیریم)} (A \cup B)' \cap (A \cap B) = \emptyset$$

دلیل تهی‌بودن اشتراک بالا را به راحتی می‌توان روی نمودار ون دید:

$$(A \cup B)' \cap A \cap B = \emptyset$$

گام دوم: حالا به سراغ پرانتز سمت راست می‌رویم. طبق مورد (۲) درس باکس  $(A \cap B)' = A' \cup B'$  داریم:

$$A - (A' \cup B')' = A - ((A \cap B)')' = A - (A \cap B) \xrightarrow[\text{درس باکس}]{{\text{طبقه مورد}} ۴} A - B$$

گام سوم: حالا باید بین جواب‌های هر دو پرانتز (جواب‌های گام اول و دوم)، اجتماع بگیریم:  
 $\emptyset \cup (A - B) = A - B$



اگر  $A - B = A$  باشد، آن‌گاه کدام مجموعه، زیرمجموعه دلخواهی مثل  $C$  است؟

$$(A' \cup B')' \quad (2)$$

$$A' \cap B \quad (1)$$

$$(A \cup B)' \quad (4)$$

$$A \cap B' \quad (3)$$

از این‌که  $A - B = A$  هست، یک نتیجه مهم می‌توانی بگیری. از نمودار ون کمک بگیر و بین چه موقع  $A - B = A$  می‌شود.


**Hint**

قوانين مهم مجموعه‌ها

درس Box

فرم ریاضی	اسم قانون
$A \cup B = B \cup A$	جایه‌جایی
$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$	شرکت‌پذیری
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	پخشی
$(A \cup B)' = A' \cap B'$	دمورگان
$A \cup (A \cap B) = A$	جدب
$A - B = A \cap B'$	تبديل تفاضل به اشتراک

فاهمندی‌لین که  $A - B = A$  است، نتیجه می‌شود که  $A \cap B = \emptyset$  است. چراً این را می‌توان از روی نمودار ون به سادگی



اگر این دو مجموعه اشتراک داشته‌ند،  
دیگر  $A - B$  برابر با کل  $A$  نمی‌شد.

(۲) مجموعه تهی ( $\emptyset$ )، زیرمجموعه همه مجموعه‌هاست.

**پاسخ خیلی تشریحی ✓** گام اول: از این‌که  $A - B = A$  است، نتیجه می‌گیریم که  $A \cap B = \emptyset$  است. همچنین می‌دانیم که فقط مجموعه  $\emptyset$  زیرمجموعه هر مجموعه دلخواهی می‌تواند باشد. پس در بین گزینه‌ها باید دنبال گزینه‌ای باشیم که برابر با  $\emptyset$  باشد.

گام دوم: گزینه‌ها را تک‌به‌تک بررسی می‌کنیم:

$$A' \cap B = B \cap A' \xlongequal{\text{تبديل اشتراک به تفاضل}} B - A \quad \times \quad \text{جابه‌جایی}$$

(در صورتی برابر با  $\emptyset$  می‌شود که  $A$  و  $B$  با هم برابر باشند.)

$$(A' \cup B')' = ((A \cap B)')' = (\emptyset)' = \emptyset \quad \checkmark \quad \text{دمورگان}$$

$$A - B = A \cap B' \quad \times \quad \text{تبديل اشتراک به تفاضل} \quad \text{(در صورتی برابر با } \emptyset \text{ می‌شود که  $A$  و  $B$  با هم برابر باشند.)} \quad \text{گزینه (۳)}$$

$$(A \cup B)' = A' \cap B' \quad \times \quad \text{گزینه (۴)}$$

نکته



کدام یک از مجموعه‌های زیر نامتناهی است؟

۵۹

الف) اعداد طبیعی که می‌توان آن‌ها را به صورت مجموع مربعات سه عدد طبیعی دیگر نوشت.

ب) اعداد گویایی مانند  $\frac{a}{b+1}$  که از  $\frac{a}{b}$  کوچک‌تر هستند. ( $a, b \in \mathbb{N}$ )

(۲) فقط ب

(۱) فقط الف

(۴) هیچ‌کدام

(۳) الف و ب

برای تشخیص این که مجموعه‌ای متناهی یا نامتناهی است، باید تعداد اعضای آن مجموعه را بشماریم. اگر این تعداد «عددی حسابی» بود، به آن مجموعه متناهی می‌گویند؛ ولی اگر این تعداد «بی‌نهایت» بود، به آن مجموعه نامتناهی می‌گویند.

Hint

مجموعه‌تهی ( $\emptyset$ )، متناهی است.

نکته

پاسخ خیلی تشریحی ✓

گام اول: مجموعه «الف» نامتناهی است. هر عددی به فرم  $a^3 + b^3 + c^3$  که  $a, b, c \in \mathbb{N}$  باشند، در این مجموعه قرار دارد. به عنوان مثال اعداد  $1+1+4$ ,  $1+9+36$ ,  $4+9+25$ ,  $25+25+25$  و ... همگی عضو این مجموعه‌اند.

گام دوم: این مجموعه  $\emptyset$  است، زیرا در اعداد مثبت  $(a, b \in \mathbb{N})$ ، بزرگ‌کردن مخرج باعث کوچک‌شدن کسر می‌شود؛ بنابراین فقط «الف» نامتناهی است.



اگر  $B \cap C = \emptyset$  باشد، آنگاه کدام یک از مجموعه های زیر، متناهی است؟

$$B - C \quad (2)$$

$$B \cap C \quad (1)$$

$$A \cap B \quad (4)$$

$$A \cap B' \quad (3)$$

**Hint** با عدد دادن به  $n$ ، چندتا عضو اول هر مجموعه را بنویس تا راحت‌تر بتوانی گزینه‌ها را بررسی کنی.

گام اول: ابتدا اعضای مجموعه های  $A$ ,  $B$  و  $C$  را مشخص می‌کنیم تا بتوانیم به بررسی گزینه‌ها بپردازیم:

$$A = \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N} \right\} = \left\{ 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots \right\}$$

$$B = \left\{ \frac{n}{2^n} \mid n \in \mathbb{N} \right\} = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{2}{2^2}, \frac{3}{2^3}, \dots \right\}$$

$$C = \left\{ \frac{1}{2n+1} \mid n \in \mathbb{N} \right\} = \left\{ \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \dots \right\}$$

گام دوم: حالا هر گزینه را در یک گام بررسی می‌کنیم:

$B \cap C$ : همان‌طور که در گام اول اعضای مجموعه  $B$  را نوشتم، مشخص است که همه عناصر  $B$ . مخرج زوج دارند. چرا؟ چون


عامل ۲ در همه مخرج‌ها وجود دارد؛ در صورتی که مجموعه  $C$  دارای مخرج فرد هستند؛ پس این دو مجموعه هیچ اشتراکی ندارند و

$$B \cap C = \emptyset$$

پس این مجموعه متناهی است و جواب سؤال گزینه (۱) است و به بررسی گزینه‌های دیگر نیازی نیست، ولی ما برای تمرین بیشتر،

گزینه‌های دیگه را هم بررسی می‌کنیم:

گام سوم: حالا می‌خواهیم اعضای  $C - B$  را مشخص کنیم. در گام اول فهمیدیم که این دو مجموعه هیچ اشتراکی ندارند، یعنی



پس  $B - C = B$  و خود  $B$  هم که نامتناهی است. چرا؟ چون می‌توانیم تا هر کجا که

می‌خواهیم به  $n$  عدد بدھیم و اعضای  $B$  را بسازیم. تا بنهایت!

گام چهارم: مجموعه  $A \cap B'$  برابر  $A - B$  است. باید تمام اعضایی که در  $B$  هستند را از  $A$  کم کنیم. یعنی اعضای  $\dots, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \dots$

باقی می‌مانند که اعضای این مجموعه هم نامتناهی است.

گام پنجم: اعضای  $\dots, \frac{1}{2}, \frac{4}{2^2}, \frac{8}{2^3}, \dots$  همگی عضو  $A \cap B'$  هستند. در اصل اون‌هایی که مخرج و صورتشون توانی از ۲ می‌شود؛ پس این مجموعه هم به همان دلیل بالا نامتناهی است.



فرض کنید  $B = \{x \mid 0 \leq x + 2 < 4a + 2\}$  و  $A = \{x \mid a - 2 < x \leq 6a\}$  و  $B$  جدا از هم باشند.

فرض کنید  $a$  حدود  $a$  کدام است؟

۷۱

آن گاه حدود  $a$  کدام است؟

$$(-\infty, -1) \quad (2)$$

$$(-\infty, \frac{-2}{3}) \quad (1)$$

$$(\frac{-2}{5}, +\infty) \quad (4)$$

$$(\frac{-2}{5}, \frac{-1}{3}) \quad (3)$$

۷۲

فرض کنید  $(x_2, y_2)$  و  $[x_1, y_1]$  دو بازه با اشتراک  $\emptyset$  باشند. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که:

نکته

$$\begin{cases} y_2 \leq x_1 \\ \text{یا} \\ y_1 < x_2 \end{cases}$$

گام اول: مجموعه  $A$  همان بازه  $[a - 2, 6a]$  است، اما مجموعه  $B$  را باید با حل  $0 \leq x + 2 < 4a + 2$  تعیین کنیم. برای این که

$$B = \{x \mid -2 \leq x < 4a\} = [-2, 4a)$$

$x$  در وسط تنها شود، از طرفین نامساوی ۲ را کم می‌کنیم:

گام دوم: شرط بازبودن را می‌نویسیم:

$$\begin{cases} a - 2 < 6a \\ \text{و} \\ -2 < 4a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{-2}{5} < a \\ \text{و} \\ \frac{-1}{2} < a \end{cases} \Rightarrow \frac{-2}{5} < a$$

گام سوم: از نکته بالا استفاده می‌کنیم:

$$\begin{cases} 4a \leq a - 2 \\ \text{یا} \\ 6a < -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a \leq \frac{-2}{3} \\ \text{یا} \\ a < \frac{-1}{3} \end{cases} \Rightarrow a < \frac{-1}{3}$$

$$\frac{-2}{5} < a < \frac{-1}{3}$$

از گام‌های دوم و سوم اشتراک می‌گیریم و داریم:

۷۲



اگر  $n(A \cup B) = 38$  و  $n(A - B) = 3n(B - A) = 4n(A \cap B)$  کدام است؟

۳۲ (۴)

۲۸ (۳)


۳۰ (۲)

۲۶ (۱)



نمودار ون بکشید، قسمت اشتراک دو مجموعه را  $X$  در نظر بگیرید و تعداد اعضای بقیه مجموعه‌ها را بر حسب آن بنویسید.

گام اول: نمودار ون می‌کشیم و قسمت اشتراک دو مجموعه را  $X$  در نظر می‌گیریم:



$$n(A \cap B) = x$$

$$n(A - B) = 4n(A \cap B) = 4x$$

$$n(B - A) = \frac{4}{3} n(A \cap B) = \frac{4}{3} x$$

گام دوم: مجموع سه قسمت مشخص شده روی نمودار ون بالا، باید برابر با  $n(A \cup B) = 38$  باشد، پس:

$$4x + x + \frac{4}{3}x = 38 \quad \xrightarrow{\text{محرج مشترک}} \quad \frac{12+3+4}{3}x = 38$$

$$\Rightarrow \frac{19}{3}x = 38 \Rightarrow x = \frac{38 \times 3}{19} = 6$$

گام سوم: سؤال از ما تعداد اعضای  $A$  را می‌خواهد. به نمودار ون نگاه کنید؛ تعداد اعضای  $A$  برابر است با:  
 $n(A) = 4x + x = 5x = 5 \times 6 = 30$ .

**Hint**

پاسخ خیلی تشریحی ✓

در یک کلاس ۳۶ نفره، ۱۵ نفر فقط به فوتبال علاقه‌مند هستند. اگر ۱۲ نفر به والیبال علاقه داشته باشند، چه تعداد از دانشآموزان به

هیچ کدام از این دو رشته، علاقه‌مند نیستند؟

۹ (۴)

۸ (۳)

۷ (۲)

۶ (۱)




**مشاوره** از تمرین‌ها و مثال‌های کتاب درسی غافل نشود. این سؤال از صفحه ۱۲ کتاب درسی گرفته شده است.

تعداد اعضای اشتراک را  $X$  بگیرید و بقیه قسمت‌ها را برحسب  $X$  بنویسید.

**Hint**

**درس Box**



تقسیم نمودار ون مربوط به دو مجموعه  $A$  و  $B$  به چهار ناحیه:


$(A \cap B)'$ اً' $\cup B'$ یا $A' \cap B'$	$(A \cup B)'$ ب' یا $A' \cap B'$	$B'$	$A'$	$B - A$	$A - B$	$A \cup B$	$A \cap B$	$B$	$A$	مجموعه
۱, ۳, ۴	۴	۱, ۴	۳, ۴	۳	۱	۱, ۲, ۳	۲	۲, ۳	۱, ۲	شماره ناحیه‌ها

برای حل سؤالات تعداد اعضای مجموعه‌ها در حالی که دو مجموعه  $A$  و  $B$  در مجموعه مرجع  $U$  تعریف می‌شوند، گام‌های زیر را حل می‌کنیم:

نمودار ون به صورت زیر می‌کشیم:	گام اول
با ناحیه ۲ شروع می‌کنیم. اگر تعداد اعضا‌یش را داشتیم، عده‌ش را داخل ناحیه ۲ قرار می‌دهیم و اگر هم نداشتیم آن را $X$ می‌گیریم.	گام دوم
اعضای سه ناحیه دیگر را می‌نویسیم (ناحیه ۱، ۳ و ۴). ممکن است بعضی از آن‌ها را برحسب $X$ بنویسیم.	گام سوم
مجموع اعضا این چهار ناحیه را برابر با تعداد اعضای $U$ قرار می‌دهیم.	گام چهارم

گام اول: با فرض این‌که  $A$  نمایشگر دانشآموزان علاقه‌مند به فوتبال و  $B$  نمایشگر دانشآموزان علاقه‌مند به والیبال است، نمودار

ون می‌کشیم:



۱) فقط علاقه‌مند به فوتبال


۲) علاقه‌مند به هر دو رشته فوتبال و والیبال

۳) فقط علاقه‌مند به والیبال

۴) بی‌علاقه به هر دو رشته

گام دوم: با توجه به اطلاعات مسئله، نمودار ون را به صورت مقابل تکمیل می‌کنیم:

۳۶



همان‌طور که می‌بینید ناحیه ۴ شامل  $= 9$  شما  $= (15 + X + 12 - X) - 36$  نفر است.



۲۰ درصد از جمعیت زنان یک شهر، هیچ گونه علاقه‌ای به آشیزی ندارند. اگر ۳۰ درصد مردانی که به آشیزی علاقه‌مندند، برابر با ۶ درصد کل جامعه باشند، آن‌گاه چنان‌چه فقط ۲۵ درصد مردان جامعه به آشیزی بی‌علاقه باشند، نسبت جمعیت مردان به زنان در این شهر کدام است؟

$\frac{4}{11}$

$\frac{1}{4}(3)$

$\frac{1}{3}(2)$

$\frac{5}{13}(1)$



Hint

جمعیت زنان را  $x$  و جمعیت مردان را  $y$  گرفته و اطلاعات مسئله را برحسب آن‌ها بنویسید.  
گام اول: جمعیت زنان را  $x$  و جمعیت مردان را  $y$  در نظر می‌گیریم. اطلاعات مسئله چنین هستند:

$$\left. \begin{array}{l} \text{زنان: } \frac{2}{100}x = \frac{2}{100}y \\ \text{مردان: } \frac{8}{100}x = \frac{25}{100}y \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{علقه به آشیزی ندارند.} \\ \text{علقه به آشیزی دارند.} \end{array}$$

گام دوم: حالا با توجه به اطلاعات بهدست‌آمده در گام اول، اطلاعات مسئله را به زبان ریاضی می‌نویسیم:

$$\frac{3}{100}\left(\frac{75}{100}y\right) = \frac{6}{100}(x+y)$$

$$\frac{9}{40}y = \frac{3}{5}(x+y) \Rightarrow \frac{15}{4}y = x+y \Rightarrow \frac{11}{4}y = x \Rightarrow \frac{y}{x} = \frac{4}{11}$$

گام سوم: حالا کمی ساده‌سازی انجام می‌دهیم:



جمله‌های سوم و هفتم یک الگوی خطی به ترتیب ۴ و ۱۰ هستند. جمله یازدهم دنباله کدام است؟

۱۷ (۴)

۱۶ (۳)

۱۵ (۲)

۱۴ (۱)

۷۵

۷۶

**مشاوره** این سؤال مشابه سؤال ۲ کنکور تجربی سال ۱۴۰۱ است.

$$\begin{array}{ccccccc} 5 & , & 8 & , & 11 & , & 14, \dots \\ +3 & & +3 & & +3 & & \end{array}$$

**الگوی خطی:** الگو با جمله عمومی  $t_n = an + b$  را الگوی درجه یک یا الگوی خطی می‌نامیم.

مثالاً جملات الگوی  $t_n = 3n + 2$  به صورت مقابل اند:

درس Box

در الگوی خطی، مقداری ثابت به جملات اضافه می‌شود. (این مقدار ثابت همان ضریب  $n$  در جمله عمومی می‌باشد).

گام اول: جمله عمومی را  $t_n = an + b$  می‌گیریم. داریم:

$$\begin{cases} t_3 = 4 \\ t_7 = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3a + b = 4 \\ 7a + b = 10 \end{cases} \xrightarrow{\text{ضرب در } -1} \begin{cases} -3a - b = -4 \\ 7a + b = 10 \end{cases} \oplus \Rightarrow 4a = 6 \Rightarrow a = \frac{3}{2}$$

گام دوم: با قراردادن  $a = \frac{3}{2}$ ،  $3a + b = 4$  به دست می‌آید:

$$3a + b = 4 \Rightarrow 3\left(\frac{3}{2}\right) + b = 4 \Rightarrow b = 4 - \frac{9}{2} = \frac{8}{2} - \frac{9}{2} = -\frac{1}{2}$$


گام سوم: جمله یازدهم یا همان  $t_{11}$  برابر است با:

$$t_{11} = 11a + b = (11 \times \frac{3}{2}) - \frac{1}{2} = \frac{33}{2} - \frac{1}{2} = \frac{32}{2} = 16$$

۷۶



در الگوی زیر، تعداد نقطه‌ها در شکل پانزدهم کدام است؟




۴۸ (۱)

۴۹ (۲)

۴۷ (۳)

۵۰ (۴)



اعداد متناظر با تعداد دایره‌های هر شکل را بنویسید؛ سپس اختلاف بین جملات متولی را پیدا کنید.



پاسخ خیلی شریحی ✓ گام اول: تعداد دایره‌های هر شکل را زیرشان می‌نویسیم:

گام دوم: اختلاف اعداد متولی در الگوی بالا، عددی ثابت است؛ پس با یک الگوی درجه‌یک روبه‌رو هستیم:

$$7, 9, 10, 10, 13, \dots$$

$+3$                    $+3$

ضریب  $n$  همان اختلاف بین جملات متولی یعنی عدد ۳ است؛ پس جمله عمومی آن به صورت  $t_n = 3n + b$  در می‌آید.گام سوم: جمله اول الگو ۷ است. با جای‌گذاری  $n = 1$  و  $t_1 = 7$ ، مقدار  $b$  را به دست می‌وریم:

$$t_n = 3n + b \xrightarrow{n=1, t_1=7} t_1 = 3 \times 1 + b \Rightarrow 7 = 3 + b \Rightarrow b = 4$$

گام چهارم: جمله عمومی الگو به صورت  $t_n = 3n + 4$  شد؛ پس جمله پانزدهم ( $n = 15$ ) برابر است با:

$$t_n = 3n + 4 \xrightarrow{n=15} t_{15} = 3 \times 15 + 4 = 45 + 4 = 49$$

در الگوی زیر، شکل نهم از چند نقطه تشکیل شده است؟




۱۲۳ (۱)

۱۳۵ (۲)

۱۴۴ (۳)

۱۴۵ (۴)

**مشاوره** این سؤال از فعالیت صفحه ۱۷ و ۱۸ کتاب درسی گفته شده است.


**الگوی درجه‌دو**

 جمله عمومی الگوی درجه‌دو به صورت  $t_n = an^2 + bn + c$  است.

 مثلاً  $t_n = 2n^2 + n - 1$  یک دنباله درجه‌دو است. جملات آن به صورت زیر هستند.

مقداری که به جملات متولی اضافه می‌شود را می‌نویسیم:

$$\begin{array}{cccc} 2, & 9, & 20, & 35, \dots \\ +7 & +11 & +15 \\ +4 & +4 \end{array}$$

 در دنباله  $\dots, 7, 11, 15, \dots$  اختلاف دو جمله متولی همواره ۴ است.

 نصف این عدد، همواره ضریب  $n^2$  در دنباله است. در اینجا هم نصف عدد ۴، می‌شود ۲ که ضریب  $n^2$  در جمله عمومی است.

گام اول: تعداد نقاطه‌ها را می‌نویسیم:

$$\begin{array}{cccc} 1, & 5, & 13, & 25 \\ +4 & +8 & +12 \\ +4 & +4 \end{array}$$


**پاسخ خیلی تشریحی ✓**

گام دوم: برای پیدا کردن یک الگو، اختلاف جمله‌ها را می‌نویسیم:

گام سوم: اختلاف‌ها مضارب ۴ هستند؛ پس ادامه الگو را می‌نویسیم:

$$t_4 = 25 + (16 + 20 + 24 + 28 + 32) = t_9 \Rightarrow t_9 = 25 + 120 = 145$$

گام اول: تعداد نقاط هر شکل برابر است با:



گام دوم: دقت کنید که:

$$t_3 = (1+3)+5+(1+3) = 4+5+4 = 2^2 + 2^2 + 5$$

$$t_4 = (1+3+5)+7+(5+3+1) = 9+7+9 = 3^2 + 3^2 + 7$$

گام سوم: الگوی این اعداد را پیدا می‌کنیم:

$$t_n = (n-1)^2 + (n-1)^2 + 2n - 1 = 2(n-1)^2 + 2n - 1$$

گام چهارم: جمله نهم را به دست می‌آوریم:

$$t_9 = 2(8)^2 + 2 \times 9 - 1 = 128 + 17 = 145$$



گام اول: بیایید این بار از روش اشاره‌شده در درس باکس استفاده کنیم؛ تعداد نقاطه‌ها برابر است با:

$$\begin{array}{cccc} 1, & 5, & 13, & 25 \\ +4 & +8 & +12 \\ +4 & +4 \end{array}$$

$$t_n = 2n^2 + bn + c$$

 پس طبق درس باکس، ضریب  $n^2$  برابر است با  $\frac{4}{2}$  و داریم:



گام دوم: حالا  $t_1$  و  $t_2$  را نوشته و دو معادله با دو مجهول  $b$  و  $c$  تشکیل می‌دهیم و  $b$  را به دست می‌آوریم:

$$\begin{cases} t_1 = 2 + a + b = 1 \\ t_2 = 8 + 2a + b = 5 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a + b = -1 \\ 2a + b = -3 \end{cases} \xrightarrow{\text{ضرب در } -1} \begin{cases} -a - b = 1 \\ 2a + b = -3 \end{cases} \oplus$$

$$a = -2$$

$a + b = -1 \xrightarrow{a = -2} -2 + b = -1 \Rightarrow b = 1$  را به دست می‌آوریم:

پس فرم کلی معادله ما به صورت  $t_n = 2n^2 - 2n + 1$  درآمد.

گام سوم:  $t_9$  را می‌خواهیم. پس  $t_9$  برابر است با:

$$t_9 = 2(9)^2 - 2(9) + 1 = 2(81) - 18 + 1 = 145$$



در یک الگوی خطی، مجموع پنج جمله اول، برابر ۱۲ است. اگر مجموع جملات ششم تا دهم برابر ۱۸ باشد، فاصله دو جمله متوالی کدام است؟

$$\frac{3}{20} (4)$$

$$\frac{3}{25} (3)$$

$$\frac{3}{10} (2)$$

$$\frac{6}{25} (1)$$



**Hint**

جملات خواسته شده را بنویسید و تفاضل مورد نظر را محاسبه کنید.

در یک الگوی خطی همواره  $t_m - t_n = (m-n)a$  برقرار است. این الگوها از دستور  $t_n = an + b$  پیروی می‌کنند.



**نکته**

**پاسخ خیلی تشریحی**

کام اول: اطلاعات مسئله را به زبان ریاضی می‌نویسیم:

$$\begin{cases} t_1 + t_2 + \dots + t_5 = 12 \\ t_6 + t_7 + \dots + t_{10} = 18 \end{cases} \xrightarrow{\text{منها}} \underbrace{(t_6 - t_1)}_{\Delta a} + \underbrace{(t_7 - t_2)}_{\Delta a} + \dots + \underbrace{(t_{10} - t_5)}_{\Delta a} = 6$$

طبق نکته می‌شود

کام دوم: به کمک نکته بالا مقدار  $d$  را به دست می‌آوریم:

$$\Delta a + \Delta a + \dots + \Delta a = 6 \Rightarrow 5\Delta a = 6 \Rightarrow a = \frac{6}{25}$$



## آزمون مرحله اول

در یک الگوی خطی جمله‌های ششم و دهم به ترتیب  $2 + x$  و  $x + 14$  هستند. در این الگو، جمله پنجم چند واحد از جمله دوم بزرگ‌تر است؟

۹) ۴

۸) ۳

۶) ۲

۴) ۱

۱۹



Hint

پاسخ خیلی تشریحی ✓

جمله عمومی الگوی خطی  $t_n = an + b$  است. در این الگو،  $t_1 = 10a - 6a = 4a$  و  $t_5 = 5a - 2a = 3a$  است.

گام اول: اختلاف جملات ششم و دهم برابر  $4a$  است، پس داریم:

$$t_{10} - t_6 = 4a \Rightarrow (x + 14) - (x + 2) = 12 = 4a \Rightarrow a = 3$$

گام دوم: اختلاف جمله پنجم از دوم برابر است با:

$$t_5 - t_2 = 3a \Rightarrow t_5 - t_2 = 3 \times 3 = 9$$

۱۸

جمله‌چندم برابر با  $a_m$  است؟

۸) ۴

۵) ۳

۷) ۲

۴) ۱

$$\text{در دنباله } a_n = \frac{\Delta n + 1}{2n - 7} \text{ کدام است؟}$$



Hint

با به دست آوردن  $a_4$ , می‌توانی ادامه حل را انجام بدی.

گام اول: در صورت سؤال مقدار  $m$  را می‌خواهیم که به  $a_m$  وابسته است و  $a_m$  هم به  $a_4$  وابسته است.

$a_4 = \frac{\Delta \times 4 + 1}{2 \times 4 - 7} = \frac{3}{1} = 3$

پس ابتدا مقدار  $a_4$  را به دست می‌آوریم:

گام دوم: حالا ببینیم  $a_m$  برابر چه عددی است:

گام سوم: این که  $\frac{45}{\gamma}$  است، یعنی یکی از جملات دنباله برابر  $\frac{45}{\gamma}$  است که در اصل جمله  $7m$  است. حالا  $m$  را جهطور به

دست بیاریم؟ باید مقدار دنباله را در جمله  $7m$  برابر  $\frac{45}{\gamma}$  قرار بدیم:

$$\frac{\Delta m + 1}{2m - 7} = \frac{45}{\gamma} \Rightarrow 35m + 7 = 90m - 315$$

$$\Rightarrow 55m = 385 \Rightarrow m = \frac{385}{55} = 7$$

پس جمله  $7m$  دنباله برابر  $\frac{45}{7}$  است.