



مدت امتحان : ۱۱۰ دقیقه	نام و نام خانوادگی :	رشته : ریاضی فیزیک	سوالات امتحان نهایی درس : فیزیک ۳
ساعت شروع : ۸ صبح	تاریخ امتحان : ۱۳۹۸ / ۳ / ۵	تعداد صفحه : ۳	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir			دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۸




توجه : استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی ، جذر و درصد) بلامانع است .

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
۱	<p>در جمله های زیر ، عبارت درست را از داخل پرانتز انتخاب کرده و در پاسخ برگ بنویسید :</p> <p>الف) در حرکت (با شتاب ثابت - یکنواخت) بر خط راست ، سرعت متوسط و سرعت لحظه ای با هم برابرند . ب) سطح محصور بین نمودار سرعت - زمان و محور زمان برابر تغییر (مکان - سرعت) است . پ) در حرکت کندشونده روی خط راست ، بردارهای سرعت و شتاب (هم جهت - در خلاف جهت هم) هستند . ت) عقرهه تندی سنج خودروها ، تندی (متوسط - لحظه ای) را نشان می دهند .</p>	۱
۲	<p>معادله حرکت جسمی که روی خط راست حرکت می کند ، در SI به صورت $x = 5t^3 - 6t^2$ است .</p> <p>الف) سرعت اولیه جسم را تعیین کنید . ب) سرعت متوسط جسم را بین دو لحظه $t_1 = 0$ و $t_2 = 2s$ حساب کنید .</p>	۰/۲۵
۳	<p>نمودار سرعت - زمان حرکت سقوط آزاد یک جسم مطابق شکل است :</p> <p>(الف) زمان سقوط جسم (t) را بدست آورید . (ب) ارتفاع سقوط چقدر بوده است ؟ (پ) نمودار مکان - زمان آن را رسم کنید .</p> 	۰/۵ ۰/۵ ۰/۵
۴	<p>درستی یا نادرستی جمله های زیر را با علامت های (د) یا (ن) مشخص کنید .</p> <p>الف) لختی ، به خاصیتی در اجسام می گویند که می خواهند وضعیت حرکت خود را تغییر دهند . ب) تغییر تکانه ناشی از نیروی متوسط برابر با تغییر تکانه نیروی واقعی متغیر با زمان است . پ) نیروی مقاومت یک شاره مانند هوا ، به تندی حرکت جسم بستگی دارد . ت) نیروهای کنش و واکنش هم نوع نیستند و اثرات یکسانی ایجاد می کنند . ث) مربع دوره گردش ماهواره ها به دور زمین ، متناسب با مکعب فاصله آن ها از مرکز زمین است .</p>	۱/۲۵
۵	<p>مطابق شکل ، نیروی افقی \vec{F}_1 بر جعبه وارد می شود ، اما جعبه هم چنان ساکن است . اگر در همین حالت ، بزرگی نیروی قائم \vec{F}_2 از صفر شروع به افزایش کند ، کمیت های زیر چگونه تغییر می کنند ؟</p> <p>الف) اندازه نیروی عمودی سطح وارد بر جعبه ب) اندازه نیروی اصطکاک ایستایی وارد بر جعبه پ) اندازه بیشینه نیروی اصطکاک ایستایی ت) نیروی خالص وارد بر جسم</p> 	۱
	ادامه سوالات در صفحه دوم	

سؤالات امتحان نهایی درس : فیزیک ۳	رشته : ریاضی فیزیک	نام و نام خانوادگی :	مدت امتحان : ۱۱۰ دقیقه
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	تعداد صفحه : ۳	تاریخ امتحان : ۱۳۹۸ / ۳ / ۵	ساعت شروع : ۸ صبح
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۸ http://aee.medu.ir			مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی


ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره												
۶	<p>الف) جسمی به وزن 60 نیوتن را با طناب سبکی به طرف بالا می کشیم . اگر شتاب ثابت رو به بالای جسم 2 m/s^2 باشد ، نیروهای وارد بر جسم را رسم کرده و نیروی کشش طناب را بدست آورید . $(g = 10 \text{ m/s}^2)$</p> <p>ب) تندی نوک عقربه ثانیه شمار یک ساعت دیواری به طول 10 cm را حساب کنید .</p>	۱ ۰/۷۵												
۷	<p>در جمله های زیر ، جاهای خالی را با کلمه های مناسب تکمیل کنید :</p> <p>الف) افزایش جرم در یک سامانه جرم - فنر ، باعث می شود که دوره نوسان ها شود .</p> <p>ب) انرژی مکانیکی هر نوسانگ هماهنگ ساده ، با مربع دامنه است .</p> <p>پ) نوسان هایی با اعمال یک نیروی خارجی ، نوسان های نام دارند .</p> <p>ت) یکای در SI ، وات بر متر مربع (W/m^2) است .</p>	۱												
۸	<p>شكل زیر ، جهت های حرکت یک چشمۀ صوتی و یک ناظر (شنونده) را در وضعیت های مختلف نشان می دهد :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>وضعیت</th> <th>چشمۀ</th> <th>ناظر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(a)</td> <td>●</td> <td>😊</td> </tr> <tr> <td>(b)</td> <td>● →</td> <td>😊</td> </tr> <tr> <td>(c)</td> <td>●</td> <td>😊 →</td> </tr> </tbody> </table> <p>بسامدی را که ناظر در وضعیت های (b) و (c) می شنود ، با وضعیت (a) مقایسه کنید .</p>	وضعیت	چشمۀ	ناظر	(a)	●	😊	(b)	● →	😊	(c)	●	😊 →	۰/۵
وضعیت	چشمۀ	ناظر												
(a)	●	😊												
(b)	● →	😊												
(c)	●	😊 →												
۹	<p>شكل روبرو ، یک موج سینوسی را در لحظه ای از زمان در یک ریسمان کشیده شده ، نشان می دهد .</p> <p>الف) اگر تندی موج $1/2 \text{ m/s}$ باشد ، بسامد موج چند هرتز است ؟</p> <p>ب) نقطه M ریسمان ، در این لحظه بالا می رود یا پایین ؟</p>	۱ ۰/۲۵												
۱۰	<p>معادله حرکت هماهنگ ساده یک نوسانگ در SI به صورت $x = 0.05 \cos 5\pi t$ است . در چه لحظه ای پس از زمان صفر ، برای دومین بار انرژی جنبشی آن بیشینه می شود ؟</p>	۱												
۱۱	<p>به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید :</p> <p>الف) تأخیر زمانی بین دو صوت چقدر باشد تا گوش انسان پژواک را از صوت مستقیم اولیه تمیز دهد ؟</p> <p>ب) در آزمایش یانگ اگر بجای نور قرمز از نور آبی استفاده کنیم ، پهنانی نوارها کاهش می یابند یا افزایش ؟</p> <p>پ) اجاق های میکروموج (مايكروفر) ، بر چه اساسی کار می کنند ؟</p> <p>ت) آیا در بازتاب پخشندۀ ، زاویۀ تابش و زاویۀ بازتابش با هم برابرند ؟</p>	۱												
	ادامۀ سؤالات در صفحۀ سوم													

سوالات امتحان نهایی درس : فیزیک ۳	رشته : ریاضی فیزیک	نام و نام خانوادگی :	مدت امتحان : ۱۱۰ دقیقه
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	تعداد صفحه : ۳	تاریخ امتحان : ۱۳۹۸ / ۳ / ۵	ساعت شروع : ۸ صبح
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۸ http://aee.medu.ir			مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی

ردیف	سوالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
۱۲	<p>به شکل های زیر توجه کنید :</p>   	
۰/۵	الف) شکل (۱)، نشان دهنده کدام پدیده در برهم کنش موج با محیط است و در چه صورتی رخ می دهد ؟	
۰/۵	ب) در شکل (۲)، در نقطه p تداخل سازنده است یا ویرانگر ؟ و چه نواری تشکیل می شود ؟	
۰/۵	پ) در شکل (۳)، ضریب شکست محیط دوم برای نور قرمز بیشتر است یا آبی ؟ تنیدی کدام نور بیشتر است ؟	
۱۳	اگر بسامد اصلی یک تار ویولن به طول ۸۰ cm برابر با ۲۰۰ Hz باشد، تنیدی موج در تار را بدست آورید.	
۱۴	<p>الف) ویژگی ترازهای شبه پایدار در محیط لیزری چیست ؟</p> <p>ب) با توجه به شکل، یک اشکال مدل اتمی رادرفورد را در مورد پایداری اتم توضیح دهید.</p>	
۱۵	<p>طول موج آستانه برای اثر فوتوالکترویک در یک فلز معین ۳۱۰ nm است.</p> <p>الف) تابع کار فلز را حساب کنید.</p> <p>($hc = ۱۲۴۰ \text{ eV} \cdot \text{nm}$)</p> <p>ب) اگر K_{\max} برای فوتوالکترون ها $2/2 \text{ eV}$ باشد، طول موج نور فروودی چند نانومتر است ؟</p>	
۱۶	کوتاه ترین طول موج رشته پاشن ($n' = 3$) در اتم هیدروژن را بدست آورید.	
۱۷	<p>الف) چرا واکنش زنجیری به طور طبیعی در معادن اورانیم رخ نمی دهد ؟</p> <p>ب) چه نیرویی در اتم، نوکلئون ها را در کنار یکدیگر نگه می دارد ؟</p> <p>پ) جای خالی داده شده را که ممکن است مربوط به یک یا چند ذره آلفا یا بتا باشد، کامل کنید : $^{11}\text{C} \rightarrow ^{11}\text{B} + \dots$</p>	
۱۸	از یک ماده رادیواکتیو پس از گذشت ۱۳۵ روز، $\frac{7}{8}$ ماده فعال اولیه، واپاشیده شده است. نیمه عمر این ماده چند روز است ؟	
۲۰	موفق و سربلند باشید	جمع بارم

رشته: ریاضی فیزیک
تاریخ امتحان: ۱۳۹۸ / ۳ / ۵
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی
<http://aee.medu.ir>

دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۸

ردیف	پاسخ ها	نمره
۱	الف) یکنواخت ب) مکان پ) در خلاف جهت هم ت) لحظه ای هر مورد (۰/۲۵) ص ۹ و ۱۷ و ۱۶ و ۱۳	۱
۲	$v_0 = -5 \text{ m/s}$ (۰/۲۵) $x_1 = -10 \text{ m}$ (۰/۲۵) $v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ (۰/۲۵) $x_2 = (6 \times 4) - (5 \times 2) - 10 = 4 \text{ m}$ (۰/۲۵) $v_{av} = \frac{4 - (-10)}{2} = 7 \text{ m/s}$ (۰/۲۵)	۱/۲۵
۳	$v = -gt$ (۰/۲۵) $v' = -g \Delta t$ (۰/۲۵) $t = \frac{-4}{-10} = 0.4 \text{ s}$ (۰/۲۵) $h = \Delta y = \frac{16 - 4}{2} = 6 \text{ m}$ (۰/۲۵) پ) رسم نمودار (۰/۵) 	۱/۵
۴	الف) (ن) ب) (د) پ) (د) ت) (ن) ث) (د) هر مورد (۰/۲۵) ص ۳۱ و ۳۶ و ۴۷ و ۵۶	۱/۲۵
۵	الف) افزایش می یابد ب) ثابت می ماند پ) افزایش می یابد ت) ثابت می ماند هر مورد (۰/۲۵) ص ۵۸	۱
۶	$T - mg = ma$ (۰/۲۵) رسم شکل: (۰/۲۵) $T = 60 = 6 \times 2$ (۰/۲۵) $T = 72 \text{ N}$ (۰/۲۵) $v = \frac{2\pi r}{T}$ (۰/۲۵) $v = \frac{2\pi}{60} \times 1$ (۰/۲۵) $v = \frac{\pi}{300} \text{ m/s}$ (۰/۲۵) ص ۴۵	۱/۷۵
۷	الف) بیشتر ب) متناسب پ) واحد استه ت) شدت صوت هر مورد (۰/۲۵) ص ۶۷ و ۶۸ و ۶۵ و ۶۹	۱
۸	$f_c < f_a$ و $f_b > f_a$ هر مورد (۰/۲۵) ص ۸۸	۰/۵
۹	الف) (۰/۲۵) ب) پایین (۰/۲۵) $\frac{\lambda}{2} = 12 \rightarrow \lambda = 24 \text{ cm}$ (۰/۵) $f = \frac{V}{\lambda}$ (۰/۲۵) $f = \frac{1/2}{0.24} = 5 \text{ Hz}$ (۰/۲۵) ص ۸۶	۱/۲۵
۱۰	$T = \frac{2\pi}{\omega}$ (۰/۲۵) $t = \frac{3T}{4}$ (۰/۲۵) $T = \frac{2\pi}{5\pi} = 0.4 \text{ s}$ (۰/۲۵) $t = 0.4 / 3 \text{ s}$ (۰/۲۵) ص ۸۵	۱
	ادامه پاسخ ها در صفحه دوم	

رشته : ریاضی فیزیک	
تاریخ امتحان : ۱۳۹۸ / ۳ / ۵	
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir	دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۸

ردیف	پاسخ ها	نمره
۱۱	الف) ۰/۱ ثانیه پ) تداخل امواج الکترومغناطیسی (یا تشکیل امواج ایستاده) ب) کاهش می یابند ت) بله هر مورد (۰/۲۵) ص <u>۴۵</u>	۱
۱۲	الف) پراش (۰/۲۵)، اندازه شکاف از مرتبه طول موج باشد (۰/۲۵) ب) تداخل ویرانگر (۰/۲۵)، تاریک (۰/۲۵) پ) آبی (۰/۲۵)، قرمز (۰/۲۵) ص <u>۱۰۴ و ۱۰۲ و ۱۰۰</u>	۱/۵
۱۳	$f = \frac{nV}{2L}$ (۰/۲۵) $200 = \frac{1 \times V}{2 \times 0.8}$ (۰/۲۵) $V = 320 \text{ m/s}$ (۰/۲۵) ص <u>۱۰۷</u>	۰/۷۵
۱۴	الف) در این ترازها، الکترون ها مدت زمان بیشتری نسبت به حالت برانگیخته معمولی باقی می مانند و فرصت بیشتری برای افزایش وارونی جمعیت و در نتیجه تقویت نور لیزر را فراهم می کنند . (۰/۵) ب) اگر الکترون ها را نسبت به هسته ساکن فرض کنیم ، باید تحت تأثیر نیروی ریاضی الکتریکی ، روی هسته سقوط کنند و در نتیجه پایداری آنها از بین می رود . (۰/۵) ص <u>۱۲۶ و ۱۲۱</u>	۱
۱۵	$W_0 = \frac{hc}{\lambda_0}$ (۰/۲۵) $W_0 = \frac{1240}{310} = 4 \text{ eV}$ (۰/۲۵) الف) $K_{max} = \frac{hc}{\lambda} - W_0$ (۰/۲۵) $\lambda = \frac{1240}{6/2} = 200 \text{ nm}$ (۰/۲۵) ب) ص <u>۱۲۰</u>	۱
۱۶	$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n'^2} - \frac{1}{n^2} \right)$ (۰/۲۵) $\frac{1}{\lambda} = \frac{1}{100} \left(\frac{1}{9} - 0 \right)$ (۰/۲۵) $\lambda = 900 \text{ nm}$ (۰/۲۵) ص <u>۱۲۳</u>	۰/۷۵
۱۷	الف) چون فراوانی ایزوتوپ ۲۳۵ حدود ۷۲/۰ درصد است و احتمال اینکه ایزوتوپ ۲۳۸ بتواند توسط نوترونی شکافته شود ، بسیار کم است . (۰/۵) ب) نیروی هسته ای (۰/۲۵) پ) (۰/۵) e^+ (۰/۵) e^- ص <u>۱۴۴ و ۱۴۰ و ۱۳۹</u>	۱/۲۵
۱۸	$N = \frac{N_0}{2^n}$ (۰/۲۵) $\frac{1}{8} N_0 = \frac{1}{2^3} N_0$ (۰/۲۵) $n = 3$ (۰/۲۵) $n = \frac{t}{T}$ (۰/۲۵) $T = 45$ روز (۰/۲۵) ص <u>۱۴۷</u>	۱/۲۵
	همکاران محترم ، ضمن عرض خسته نباشید لطفاً برای پاسخ های درست دیگر ، نمره لازم را در نظر بگیرید .	۲۰

AzmoonFree.ir



هرچی برای کنکور و امتحانات نهایی لازم
داری رو کامل رایگان برات فراهم میکنیم.



پخش سوالات آزمون های آزمایشی

AzmoonFree.ir

برای ورود به سایت کلیک کن