


ساعت شروع: ۸ صبح	تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۳/۲	رشته: ریاضی فیزیک	سوالات امتحان نهایی درس: هندسه ۳
تعداد صفحه: ۲	مدت امتحان: ۱۳۵ دقیقه	نام و نام خانوادگی:	پایه: دوازدهم دوره دوم متوسطه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خوداد ماه سال ۱۳۹۸ مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی			<a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
------	-------------------------	------

استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی و رادیکال) مجاز است.

۱	جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید. الف) شرط لازم و کافی برای اینکه ماتریس مربعی $A$ وارون پذیر باشد آن است که دترمینان ماتریس $A$ باشد . ب) مکان هندسی، مجموعه نقاطی از صفحه (یا فضا) است که همه آنها یک ..... داشته باشند و همچنین هر نقطه که آن ویژگی را داشته باشد عضو این مجموعه باشد. پ) در حالتی که خروج از مرکز بیضی برابر صفر باشد بیضی تبدیل به یک ..... می شود. ت) حاصل ضرب داخلی دو بردار غیر صفر $\bar{a}$ و $\bar{b}$ که بر هم عمود هستند، برابر ..... است.	۱
۰/۷۵	درستی و نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. الف) اگر برای ماتریس‌های متمایز $A$ , $B$ و $C$ داشته باشیم، $AB=AC$ ، آنگاه $Lzoma^B=C$ است. ب) در حالتی که صفحه $P$ بر محور سطح مخروطی (I) عمود نباشد و با مولد آن (d) نیز موازی نباشد و تنها یکی از دو نیمه مخروط را قطع کند، فصل مشترک حاصل یک بیضی خواهد بود. پ) نقطه (۲,-۳,۰) روی صفحه $xoy$ قرار دارد.	۲
۱	اگر $A = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$ باشد، حاصل $A^3$ را محاسبه کنید.	۳
۱/۲۵	در معادله ماتریسی $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3x & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ مقدار $x$ را بیابید.	۴
۱/۲۵	مقدار $m$ را چنان بیابید که دستگاه $\begin{cases} mx + 3y = -3 \\ 4x + (m+4)y = 2 \end{cases}$ جواب نداشته باشد.	۵
۱/۵	معادله دایره‌ای را بنویسید که خطوط $4x + 3y = -5$ و $x + y = 3$ شامل قطرهایی از آن بوده و خط $4x + 3y = 1$ بر آن مماس باشد.	۶
۱	در نقطه $A(2,3)$ روی دایرة $x^2 + y^2 - 2x - 2y = 3$ مماسی رسم کرده‌ایم، معادله این خط مماس را به دست آورید.	۷
۱/۵	اگر خروج از مرکز بیضی برابر $\frac{3}{5}$ و طول قطر کوچک بیضی ۱۶ باشد، طول قطر بزرگ بیضی و فاصله کانونی آن را به دست آورید.	۸
	«ادامه سوالات در صفحه دوم»	

ساعت شروع: ۸ صبح	تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۳/۲	رشته: ریاضی فیزیک	سوالات امتحان نهایی درس: هندسه ۳
تعداد صفحه: ۲	مدت امتحان: ۱۳۵ دقیقه	نام و نام خانوادگی:	پایه: دوازدهم دوره دوم متوسطه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خداداد ماه سال ۱۳۹۸ مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>			

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
۹	<p>دو نقطه A و B مطابق شکل روی بیضی و نقاط F و F' کانونهای بیضی‌اند. اگر AF باشد ثابت کنید دو پاره خط AF و BF' موازی‌اند.</p> 	۱/۲۵
۱۰	<p>سهمی <math>y^2 - 2y + 8x + 9 = 0</math> مفروض است.</p> <p>(الف) مختصات رأس، کانون و خط هادی سهمی را به دست آورید. (ب) نمودار آن را رسم کنید.</p>	۲
۱۱	<p>به سوالات زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) معادله صفحه‌های را بنویسید که از نقطه <math>A = (2, 3, 4)</math> بگذرد و با صفحه <math>xoy</math> موازی باشد.</p> <p>(ب) معادلات <math>\begin{cases} x = 0 \\ z = 0 \end{cases}</math> مربوط به کدام محور است؟</p> <p>(پ) در فضای <math>\mathbb{R}^3</math>، نقطه A به طول ۲ روی محور طولها و نقطه <math>B = (-4, 6, -3)</math> مفروض‌اند مختصات وسط AB را بیابید.</p>	۱/۵
۱۲	<p>اگر <math>\vec{b} = (1, 2, 1)</math> باشد، طول بردار <math>\vec{a} - 2\vec{b}</math> را به دست آورید.</p>	۱
۱۳	<p>بردارهای <math>\vec{a} = (1, -3, 2)</math> و <math>\vec{b} = (-2, 1, -5)</math> را در نظر بگیرید.</p> <p>(الف) تصویر قائم بردار <math>\vec{a}</math> را بر امتداد بردار <math>\vec{b}</math> به دست آورید. (ب) برداری عمود بر دو بردار <math>\vec{a}</math> و <math>\vec{b}</math> بنویسید.</p>	۱/۷۵
۱۴	<p>ثابت کنید: دو بردار غیر صفر <math>\vec{a}</math> و <math>\vec{b}</math> با هم موازی هستند اگر و فقط اگر <math>\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}</math>.</p>	۱
۱۵	<p>مقدار <math>m</math> را طوری تعیین کنید که سه بردار <math>\vec{a} = (1, m, -1)</math>، <math>\vec{b} = (2, 3, -1)</math> و <math>\vec{c} = (1, -1, 3)</math> در یک صفحه باشند.</p>	۱
۱۶	<p>اگر طول بردارهای <math>\vec{a}</math> و <math>\vec{b}</math> به ترتیب ۴ و ۶ و <math>12 = \vec{a} \cdot \vec{b}</math> باشد، مساحت مثلث بنای شده توسط دو بردار <math>\vec{a}</math> و <math>\vec{b}</math> را به دست آورید.</p>	۱/۲۵
	موفق و سر بلند باشید	جمع نمره
۲۰		

مدت امتحان: ۱۳۵ دقیقه	ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: ریاضی فیزیک	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: هندسه ۳
تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۳/۲		پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>		دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور خرداد ماه سال ۱۳۹۸	
ردیف	راهنمای تصحیح	نمره	
۱	(الف) $ A  \neq 0$ یا مخالف صفر (۰/۲۵) (ب) ویژگی مشترک (۰/۲۵) (پ) دایره (۰/۲۵) (ت) صفر یا $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$	۱	
۲	(الف) نادرست (۰/۲۵) (ب) درست (۰/۲۵) (پ) درست (۰/۲۵)	۰/۷۵	
۳	$ A  = 2(4 - 3) = 2 \xrightarrow{(\cdot/5)} \underbrace{ A'  =  A ^r}_{(\cdot/5)} = 8 \quad (0/25)$	۱	
۴	$\begin{bmatrix} 3x - 6 & -6x + 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = 0 \xrightarrow{(\cdot/5)} [-3x + 6 - 6x + 12] = 0 \xrightarrow{(\cdot/25)} -9x + 18 = 0 \xrightarrow{(\cdot/25)} x = 2 \quad (0/25)$	۱/۲۵	
۵	$\frac{m}{4} = \frac{3}{m+4} \neq \frac{-3}{2} \xrightarrow{(\cdot/5)} m(m+4) - 12 = 0 \xrightarrow{(\cdot/25)} \begin{cases} m = -6 \quad (0/25) \\ m = 2 \quad (0/25) \end{cases}$ غیرقابل قبول قابل قبول	۱/۲۵	
۶	$\begin{cases} x+y=1 \\ x-y=3 \end{cases} \xrightarrow{(\cdot/5)} \begin{cases} x=2 \quad (0/25) \\ y=-1 \quad (0/25) \end{cases}, r = \frac{ 4(2)+3(-1)+5 }{\sqrt{4^2+3^2}} = \frac{10}{5} = 2 \quad (0/25)$ مرکز دایره $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 4$ است. معادله دایره برابر با $r = 2$ است.	۱/۵	
۷	$O(1,1) \xrightarrow{(\cdot/25)} m_{OA} = \frac{3-1}{2-1} = 2 \xrightarrow{(\cdot/25)} m' = -\frac{1}{2} \xrightarrow{(\cdot/25)} y-3 = \frac{-1}{2}(x-2) \quad (0/25)$	۱	
۸	$\frac{c}{a} = \frac{3}{5} \rightarrow c = \frac{3}{5}a, b = 8 \xrightarrow{(\cdot/25)} a^r = b^r + c^r \xrightarrow{(\cdot/25)} a^2 = 64 + \frac{9}{25}a^2 \xrightarrow{(\cdot/25)} a = 10, c = 6 \quad (0/5)$ طول قطر بزرگ ۲۰ و فاصله کانونی ۱۲ (۰/۲۵)	۱/۵	
۹	نقاط A و B را به کانون های بیضی وصل می کنیم نقاطه A روی بیضی قرار دارد بنا به تعریف بیضی (۱) نقاطه B روی بیضی قرار دارد (۲) از (۱) و (۲) و فرض $AF = BF'$ (نتیجه می شود) بنابراین چهارضلعی $AFBF'$ یک متوازی الاضلاع است (۰/۲۵) در متوازی الاضلاع، ضلع های روبرو موازی اند. $AF \parallel BF'$ (۰/۲۵)	۱/۲۵	
	«ادامه در صفحه دوم»		

مدت امتحان: ۱۳۵ دقیقه	ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: ریاضی فیزیک	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: هندسه ۳
تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۳/۲		پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>		دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور خرداد ماه سال ۱۳۹۸	
نمره	راهنمای تصحیح	ردیف	
۲	<p style="text-align: right;">الف-</p> $(y-1)^2 = -8(x+1) \quad (0/25) \longrightarrow A(-1, 1) \quad (0/25)$ <p>دهانه سهمی به چپ و <math>a=2</math>، خط هادی ۱ و</p> <p>کانون سهمی <math>(1, 0)</math> <math>F(-3, 1) \quad (0/25)</math></p> <p>ب- نقاط کمکی: <math>B' = (-3, -3)</math> ، <math>B = (-3, 5) \quad (0/5)</math></p> <p>رسم شکل <math>(0/5)</math></p>	۱۰	
۱/۵	<p style="text-align: right;">الف)</p> <p>ب) محور <math>y</math> ها <math>(0/5)</math> <math>z = 4 \quad (0/5)</math></p> <p><math>(0/25) \quad (-1, 3, \frac{-3}{2})</math> و مختصات وسط <math>AB</math> برابر است با:</p>	۱۱	
۱	$\vec{a} - 2\vec{b} = (\underbrace{(2, 0, -1)}_{(0/25)} - \underbrace{(2, 4, 2)}_{(0/25)} = (0, -4, -3) \quad (0/25)$ $, \quad  \vec{a} - 2\vec{b}  = \sqrt{16 + 9} = 5 \quad (0/25)$	۱۲	
۱/۷۵	<p style="text-align: right;">الف)</p> $\vec{a}' = \underbrace{\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{ \vec{b} ^2} \vec{b}}_{(0/25)} = \underbrace{\frac{-2 - 3 - 1}{4 + 1 + 25} (-2, 1, -5)}_{(0/5)} = \underbrace{\frac{-1}{2} (-2, 1, -5)}_{(0/25)} \quad \text{یا} \quad (1, -\frac{1}{2}, \frac{5}{2})$ <p style="text-align: right;">ب)</p> $\vec{a} \times \vec{b} = (1, -3, 2) \times (-2, 1, -5) = (13, 1, -5) \quad (0/5)$ <p style="text-align: right;">یا:</p> $(\underbrace{\vec{b} \times \vec{a}}_{(0/25)} = (-2, 1, -5) \times (1, -3, 2) = (-13, -1, 5) \quad (0/5))$	۱۳	
۱	$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \Leftrightarrow  \vec{a} \times \vec{b}  =  \vec{0}  \Leftrightarrow \underbrace{ \vec{a}  \parallel \vec{b} }_{(0/25)} \times \sin \theta = 0 \xleftarrow[ \vec{a}  \neq 0,  \vec{b}  \neq 0]{(0/25)} \sin \theta = 0 \Leftrightarrow \underbrace{\theta = 0}_{(0/25)} \vee \underbrace{\theta = \pi}_{(0/25)} \Leftrightarrow \vec{a} \parallel \vec{b}$	۱۴	
۱	$\vec{b} \times \vec{c} = (2, 3, -1) \times (1, -1, 3) = (8, -7, -5) \quad (0/25)$ $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = 0 \xrightarrow{(0/25)} (1, m, -11) \cdot (8, -7, -5) = 8 - 7m + 55 = 0 \xrightarrow{(0/25)} m = 9 \quad (0/25)$	۱۵	
	«ادامه در صفحه سوم»		

مدت امتحان: ۱۳۵ دقیقه	ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: ریاضی فیزیک	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: هندسه ۳
تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۳/۲		پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>		دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور خرداد ماه سال ۱۳۹۸	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۶	$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{ \vec{a}   \vec{b} } = \frac{12}{4 \times 6} = \frac{1}{2} \quad (./25) \quad \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3} \quad (./25)$ <p>روش اول:</p> $S_{\triangle} = \underbrace{\frac{1}{2}  \vec{a} \times \vec{b} }_{(./25)} = \frac{1}{2}  \vec{a}   \vec{b}  \sin \theta = \underbrace{\frac{1}{2} \times 4 \times 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2}}_{(./25)} = 6\sqrt{3} \quad (./25)$ <p>روش دوم:</p> $ \vec{a} \times \vec{b} ^2 + (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 =  \vec{a} ^2  \vec{b} ^2 \quad (./25) \longrightarrow  \vec{a} \times \vec{b} ^2 + (12)^2 = (4)^2 (6)^2$ $\longrightarrow  \vec{a} \times \vec{b}  = 12\sqrt{3} \quad (./25)$ <p>مساحت مثلث برابر است با</p> $S = \frac{1}{2}  \vec{a} \times \vec{b}  = 6\sqrt{3} \quad (./25)$	۱/۲۵
۲۰	" مصحح گرامی ، به راه حل‌های درست و منطبق بر کتاب درسی بارم به تناسب منظور شود "	