

با سمه تعالی

سوالات امتحان نهایی درس: ریاضی ۳

تعداد صفحه: ۲	ساعت شروع: ۱۰ صبح	رشته: علوم تجربی
مدت امتحان: ۱۳۹۸/۱۰/۹	تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۱۰/۹	نام و نام خانوادگی:
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir		دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد درنوبت دی ماه سال ۱۳۹۸

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد) (استفاده از ماشین حساب ساده مجاز می باشد)	نمره										
۱	<p>درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.</p> <p>(الف) برد تابع با ضابطه $y = f(x)$ یعنی $f(x) = kx$ است.</p> <p>(ب) چند جمله ای $f(x) = 2x^3 + 5x^2 - 3x + 2$ بر دو جمله ای x بخش پذیر است.</p> <p>(ج) دو پیشامد A و B از هم مستقل هستند هرگاه با هم رخ ندهند.</p>	۰/۷۵										
۲	<p>درجاهای خالی عبارت ریاضی مناسب قرار دهید.</p> <p>(الف) تابعی که در یک بازه، هم صعودی و هم نزولی محسوب می شود، تابع نامیده می شود.</p> <p>(ب) دوره تناوب اصلی تابع $y = \tan x$ است.</p> <p>(ج) شکلی که از برخورد یک صفحه با یک جسم هندسی حاصل می شود، آن نامیده می شود.</p>	۰/۷۵										
۳	<p>اگر $f(x) = x^2 - 5$ و $g(x) = \sqrt{x+6}$ باشد،</p> <p>(الف) دامنه تابع fog را با استفاده از تعریف به دست آورید.</p> <p>(ب) با محدود کردن دامنه تابع f تابعی وارون پذیر بسازید.</p>	۱/۵										
۴	<p>نشان دهید توابع $f(x) = \frac{x+4}{3}$ و $g(x) = 3x - 4$ وارون یکدیگرند.</p>	۱										
۵	<p>دوره تناوب و مقادیر ماکزیمم و مینیمم تابع زیر را به دست آورید. (راه حل نوشته شود)</p> $y = -\pi \sin\left(\frac{x}{2}\right) - 2$	۱/۲۵										
۶	<p>معادله مثلثاتی $\cos 2x - \cos x + 1 = 0$ را حل کنید.</p>	۱/۵										
۷	<p>حد توابع زیر را در صورت وجود محاسبه کنید.</p> <p>(الف) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + \sqrt{2x+3}}$</p> <p>(ب) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2}{ x-3 }$</p>	۱/۷۵										
۸	<p>با در نظر گرفتن نمودار f در شکل، نقاط به طول های a و b و c و d را با مشتق های داده در جدول نظری کنید.</p> <table border="1"> <tr> <td>x</td> <td>$f'(x)$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>-0.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>۲</td> <td></td> </tr> <tr> <td>$-+0.5$</td> <td></td> </tr> </table>	x	$f'(x)$		+	-0.5		۲		$-+0.5$		۱
x	$f'(x)$											
	+											
-0.5												
۲												
$-+0.5$												

«ادامه سوالات در صفحه دوم»

با اسمه تعالی

سؤالات امتحان نهایی درس : ریاضی ۳

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

رشته : علوم تجربی

ساعت شروع: ۱۰ صبح

تعداد صفحه: ۲

مدت امتحان: ۱۳۹۸/۱۰/۹

نام و نام خانوادگی :

دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد درنوبت دی ماه سال ۱۳۹۸
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی
<http://aee.medu.ir>

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد) (استفاده از ماشین حساب ساده مجاز می باشد)	نمره
۹	مشتق تابع های زیر را به دست آورید. (ساده کردن مشتق الزامی نیست) (الف) $f(x) = (x^2 + 1)^3(5x - 1)$ (ب) $g(x) = \frac{9x - 2}{\sqrt{x}}$	۱/۷۵
۱۰	اگر $f(x) = \begin{cases} x^2 & x < 0 \\ x & x \geq 0 \end{cases}$ نشان دهید $f'_+(0)$ و $f'_-(0)$ موجودند ولی $f'(0)$ موجود نیست.	۱/۲۵
۱۱	تابع $f(x) = 7\sqrt{x} + 5$ قد متوسط کودکان را بر حسب سانتی متر تا حدود ۶۰ ماهگی نشان می دهد، که در آن x مدت زمان پس از تولد (بر حسب ماه) است. آهنگ متوسط رشد در بازه زمانی $[25, 60]$ چقدر است؟	۱
۱۲	در تابع زیر، ابتدا نقاط بحرانی تابع را به دست آورید و سپس با رسم جدول تغییرات تابع، نقاط ماکزیمم و می نیمم نسبی آن را در صورت وجود مشخص کنید. $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x - 10$	۲
۱۳	دو عدد حقیقی بیابید که تفاضل آنها ۱۰ باشد و حاصل ضربشان کمترین مقدار ممکن گردد.	۱
۱۴	کانون های یک بیضی نقاط $(1, 3)$ و $(-5, 1)$ است. (الف) فاصله کانونی و مختصات مرکز بیضی را بنویسید. (ب) اگر $a = 6$ باشد، اندازه قطر کوچک و خروج از مرکز بیضی را پیدا کنید.	۱/۵
۱۵	وضعیت دایره $y = 4 - (x - 2)^2 + (y + 3)^2$ و خط $-x - 2y = 0$ را نسبت به هم مشخص کنید.	۰/۷۵
۱۶	فرض کنید جمعیت یک کشور متشکل از ۴۰ درصد مرد و ۶۰ درصد زن باشند و احتمال شیوع یک بیماری خاص در این دو گروه به ترتیب ۳ درصد و ۵ درصد باشد. اگر فردی به تصادف از این جامعه انتخاب شود، با چه احتمالی به بیماری مورد نظر مبتلا است؟	۱/۲۵
۲۰	"موفق باشید"	جمع نمره

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۱۰:۰۰ صبح	رشته: علوم تجربی ۳ راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: ریاضی ۳
تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰		پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد در فوتب دی ماه سال ۱۳۹۸ مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir		

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	الف) نادرست هر مورد ۰/۲۵ صفحه: ۱۵ و ۵۱ و ۱۴۴ ب) درست ج) نادرست هر مورد ۰/۲۵ صفحه: ۱۵ و ۳۹ و ۱۲۴	۰/۷۵
۲	الف) ثابت هر مورد ۰/۲۵ صفحه: ۳۹ و ۷ ب) ج) سطح مقطع هر مورد ۰/۲۵ صفحه: ۱۲۴ و ۳۹	۰/۷۵
۳	(الف) $D_{fog} = \overbrace{\{x \in D_g g(x) \in D_f\}}^{(0/25)} = \overbrace{\{x \in [-6, +\infty) \sqrt{x+6} \in R\}}^{(0/5)} = [-6, +\infty) \quad (0/25)$ $(b) h(x) = x^r - 5 \quad x \geq 0 \quad (0/5)$ صفحه: ۲۲ و ۲۹	۱ ۰/۵
۴	$fog(x) = f(\frac{x+4}{3}) = 3 \frac{x+4}{3} - 4 = x + 5$ $gof(x) = g(3x - 4) = (\frac{3x - 4 + 4}{3}) = x \quad (0/5)$ صفحه: ۲۶	۱
۵	$\min = - a + c \quad (0/25)$ $\max = a + c \quad (0/25)$ $\min = \pi - 2 \quad (0/25)$ $\max = \pi + 2 \quad (0/25)$ $T = \frac{2\pi}{ b } = \frac{2\pi}{\left \frac{1}{2}\right } = 4\pi \quad (0/5)$ صفحه: ۴۰	۱/۲۵
۶	$2\cos^r x - 1 - \cos x + 1 = 0 \Rightarrow \cos x (2\cos x - 1) = 0 \Rightarrow (0/5)$ $\Rightarrow \begin{cases} \cos x = 0 & \rightarrow x = k\pi + \frac{\pi}{2} \quad (0/5) \\ \cos x = \frac{1}{2} & \rightarrow x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3} \quad (0/5) \end{cases}$ صفحه: ۴۸	۱/۵
۷	$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x-1)(x+1)(x-\sqrt{2x+3})}{x^r - 2x - 3} \quad (0/75) \quad = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x-1)(x+1)(x-\sqrt{2x+3})}{(x+1)(x-3)} = -1 \quad (0/5)$ $\text{الف) } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2}{ x-3 } = \frac{2}{0^+} = +\infty \quad (0/5)$ صفحات: ۵۳ و ۵۷	۱/۷۵

بسمله تعالیٰ	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: ریاضی ۳	رشته: علوم تجربی	ساعت شروع: ۱۰:۰۰ صبح	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه		تاریخ امتحان: ۱۴۰۹/۰۹/۱۳۹۸		
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد در فوتبال دی ماه سال ۱۳۹۸		مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir		

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۸	۷۵ هر مورد درست (۰/۲۵) صفحه	۱
۹	$\begin{array}{ c c c c c } \hline x & \mathbf{d} & \mathbf{b} & \mathbf{c} & \mathbf{a} \\ \hline f'(x) & + & +/5 & 2 & -+5 \\ \hline \end{array}$	۱
۱۰	$(الف) f'(x) = \underbrace{3(2x)(x^2 + 1)^2}_{(0/75)} (\Delta x - 1) + \underbrace{5(x^2 + 1)^2}_{(0/25)}$ $(ب) g'(x) = \frac{9(\sqrt{x}) - \left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)(9x - 2)}{(\sqrt{x})^2}$	۰/۷۵
۱۱	صفحه: ۸۸ و ۹۲	۱/۲۵
۱۰	$f'_+(\cdot) = \lim_{x \rightarrow \cdot^+} \frac{x - \cdot}{x - \cdot} = 1 \quad (0/5)$ $\Rightarrow f'_+(\cdot) \neq f'_-(\cdot) \quad (0/25)$ $f'_-(\cdot) = \lim_{x \rightarrow \cdot^-} \frac{x^2 - \cdot}{x - \cdot} = \cdot \quad (0/5)$	۱/۲۵
۱۲	صفحه: ۹۶	۱/۴
۱۳	صفحه: ۱۱۲	۱/۴
۱۴	تکمیل جدول یک نمره	۱/۲۵
۱۵	$f'(x) = 3x^2 + 6x - 9 = \cdot \quad (0/5)$ $\begin{cases} x = 1 \\ x = -3 \end{cases} \quad (0/5)$	۱/۲۵
۱۶	صفحه: ۱۱۹	۱/۲۵

بسم الله الرحمن الرحيم راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: ریاضی ۳ ساعت شروع: ۱۰:۰۰ صبح مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه			
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه تاریخ امتحان: ۱۴۰۸/۰۹/۱۳		دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد در فوتب دی ماه سال ۱۴۰۸	
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir			
ردیف	راهنمای تصحیح	ردیف	ردیف
۱/۵	$O \begin{vmatrix} 1+1 \\ 2 \\ 3-5 \\ 2 \end{vmatrix} = 1$ $(./25) \quad \text{مرکز } FF' = 3 - (-5) = 8 = 2C \rightarrow C = 4 \quad (./25)$ <p style="text-align: right;">الف)</p> $b^r = a^r - c^r = 36 - 16 = 20 \quad (./25) \rightarrow b = \sqrt{20} \Rightarrow BB' = 2\sqrt{20} \quad (./25), e = \frac{c}{a} = \frac{2}{3} \quad (./5)$ <p style="text-align: right;">صفحه ۱۳۲</p>	۱۴	(ب)
۰/۷۵	$O(2, -3), r = 2 \quad (./25), d = \frac{ -3 + 1 }{\sqrt{0 + 1}} = 2 \quad (./25)$ <p style="text-align: right;">خط و دایره بر هم مماس هستند. (۰/۲۵)</p> <p style="text-align: right;">صفحات: ۱۳۹</p>	۱۵	
۱/۲۵	$P(A) = \underbrace{\frac{40}{100} \times \frac{3}{100}}_{(./5)} + \underbrace{\frac{60}{100} \times \frac{5}{100}}_{(./5)} = \frac{42}{1000} \quad (./25)$ <p style="text-align: right;">صفحه ۱۴۷</p>	۱۶	
	" درنهایت، نظر همکاران محترم صائب است "		

AzmoonFree.ir



هرچی برای کنکور و امتحانات نهایی لازم
داری رو کامل رایگان برات فراهم میکنیم.



پخش سوالات آزمون های آزمایشی

AzmoonFree.ir

برای ورود به سایت کلیک کن