

مدت امتحان: ۱۱۰ دقیقه	تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۶/۱۷	رشته: ریاضی فیزیک - علوم تجربی	سؤالات امتحان نهایی: شیمی ۳
تعداد صفحه: ۴	ساعت شروع: ۸ صبح	نام و نام خانوادگی:	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزادسرا سرکشور در فوبت شهریور ماه سال ۱۴۰۱			مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی

ردیف	نمره	سؤالات (پاسخ نامه دارد)										
۱	۱/۲۵	<p>توجه: استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.</p> <p>با استفاده از واژه های درون کادر ، عبارت های زیر را کامل کنید . (تعدادی از واژه های درون کادر اضافی است.)</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 5px;">فراورده ها - ناهمگن - اتان - واکنش دهنده ها - فیزیکی - هیدروژنی - شیمیایی - همگن - اتن</p> <ul style="list-style-type: none"> * تنوع عدددهای اکسایش از جمله رفتارهای (T)..... عنصرها است. * گاز (b)..... یکی از مهم ترین خوراک ها در صنایع پتروشیمی است. * در یک سامانه تعادلی گرماده، با افزایش دما مقدار (p)..... در سامانه کاهش می یابد. * در ساختار یخ هر اتم اکسیژن به دو اتم هیدروژن از مولکول های دیگر با پیوندهای (t)..... متصل است. * شربت معده، مخلوط (ث)..... است که نور را پخش می کند. 										
۲	۲	<p>درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید . شکل درست عبارت های فادرست را بنویسید .</p> <p>(آ) آرایش الکترونی و انادیم (II) در حالت اکسایش (III) به صورت $[Ar] 3d^1 4s^2$ است.</p> <p>ب) برای افزایش کارایی مبدل های کاتالیستی، گاهی سرامیک را به شکل مش (دانه) های ریز درمی آورند و کاتالیزگرهای را روی آن می نشانند.</p> <p>پ) اتیلن گلیکول و ترفتاالیک اسید را به طور مستقیم نمی توان، از نفت خام به دست آورد.</p> <p>ت) عدد اکسایش اکسیژن در OF_2 برابر ۲ است.</p> <p>ث) در سلول سوختی هیدروژن-اکسیژن، بخش قابل توجهی از انرژی الکتریکی به انرژی شیمیایی تبدیل می شود.</p>										
۳	۱/۵	<p>با توجه به فرمول مولکولی ترکیب های زیر، به پرسش ها پاسخ دهید.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>(a)</th> <th>(b)</th> <th>(c)</th> <th>(d)</th> <th>ترکیب</th> </tr> <tr> <td>$C_{17}H_{35}COOH$</td> <td>$C_{17}H_{35}C_6H_5SO_4^-Na^+$</td> <td>$NaHCO_3$</td> <td>$CO(NH_2)_2$</td> <td>فرمول مولکولی</td> </tr> </table> <p>(آ) کدام ماده در آب های سخت، خاصیت پاک کنندگی خود را حفظ می کند؟ چرا؟</p> <p>ب) در ماده (a) بخش (-COOH) آب دوست یا آب گریز است؟</p> <p>پ) ماده (d) در آب حل می شود یا در هگزان؟ چرا؟</p> <p>ت) کدام ترکیب، یکی از مواد مؤثر در ضد اسید معده است؟</p>	(a)	(b)	(c)	(d)	ترکیب	$C_{17}H_{35}COOH$	$C_{17}H_{35}C_6H_5SO_4^-Na^+$	$NaHCO_3$	$CO(NH_2)_2$	فرمول مولکولی
(a)	(b)	(c)	(d)	ترکیب								
$C_{17}H_{35}COOH$	$C_{17}H_{35}C_6H_5SO_4^-Na^+$	$NaHCO_3$	$CO(NH_2)_2$	فرمول مولکولی								
		"ادامه سوالات در صفحه دوم"										

دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزادسرا سرکشی در نوبت شهریور ماه سال ۱۴۰۱	مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی	ساعت شروع: ۸ صبح	نام و نام خانوادگی:	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	رسوالت امتحان نهایی: شیمی ۳	رشته: ریاضی فیزیک - علوم تجربی	تاریخ امتحان: ۱۷/۶/۱۴۰۱	مدت امتحان: ۱۱۰ دقیقه
--	-------------------------------	------------------	---------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------

ردیف	سوالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
۱/۲۵	<p>غلظت تعادلی یون هیدرونیوم در محلول هیدروفلوریک اسید در دمای معین برابر $۰\cdot۰۵ \text{ molL}^{-1}$ است، با توجه به معادله یونش این اسید در آب، به پرسش های زیر پاسخ دهید.</p> $HF(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + F^-(aq)$ <p>(آ) غلظت تعادلی یون فلورید $[F^-]$ را با نوشتتن دلیل تعیین کنید.</p> <p>(ب) اگر ثابت یونش (K_a) اسید در این دما برابر $۹\cdot۰ \times ۱۰^{-۴} \text{ molL}^{-1}$ باشد، غلظت تعادلی $[HF]$ را حساب کنید.</p>	۴
۰/۷۵	<p>معادله های شیمیای موازن نشده زیر تهیه ماده A را به دو روش نشان می دهد.</p> <p>a) $C_6H_6 + H_2SO_4 + NaOH \rightarrow A + X + Y$</p> <p>b) $C_6H_6 + C_2H_6 + O_2 \rightarrow A + Z$</p> <p>در این واکنش ها X و Y پسماند هستند، اما Z یک حلال صنعتی است.</p> <p>بر اساس اصول شیمی سبز، کدام واکنش از دیدگاه اتمی صرفه اقتصادی دارد؟ چرا؟</p>	۵
۱/۲۵	<p>نمودارهای زیر غلظت نسبی گونه های موجود در محلول اسید های HA و HX را در دما و غلظت یکسان نشان می دهد.</p> <p>(آ) رسانایی الکتریکی کدام محلول بیشتر است؟ چرا؟</p> <p>(ب) pH کدام محلول بزرگ تر است؟ دلیل بنویسید.</p>	۶
۱/۵	<p>با توجه به شکل زیر که الگوی ساده ای از واکنش بین اتم های آهن (Fe) و اکسیژن (O) و اکسیژن (O) را با ساختار لایه ای نشان می دهد، به پرسش ها پاسخ دهید.</p> <p>(آ) کدام ساختار (۱) یا (۲) اتم آهن را نشان می دهد؟</p> <p>(ب) کدام گونه (آهن یا اکسیژن) اکسایش یافته است؟</p> <p>(پ) کدام گونه اکسیده است؟ دلیل بنویسید.</p> <p>(ت) هرگاه به جای آهن از پلاتین استفاده شود، آیا واکنشی انجام می شود؟ چرا؟</p>	۷

مدت امتحان: ۱۱۰ دقیقه	تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۶/۱۷	رشته: ریاضی فیزیک - علوم تجربی
تعداد صفحه: ۴	ساعت شروع: ۸ صبح	نام و نام خانوادگی:
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزادسراسر کشور در فوبت شهریور ماه سال ۱۴۰۱		پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

ردیف	سوالات (پاسخ نامه دارد)	نمره												
۸	<p>با توجه به جدول زیر که آنتالپی فروپاشی شبکه را برای برخی ترکیب‌های یونی، بر حسب kJmol^{-1} نشان می‌دهد، به پرسش‌ها پاسخ دهید.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">آئیون</td> <td style="text-align: center;">F^-</td> <td style="text-align: center;">O^{2-}</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">کاتیون</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Na^+</td> <td style="text-align: center;">۹۲۶</td> <td style="text-align: center;">?</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Mg^{2+}</td> <td style="text-align: center;">۲۹۶۵</td> <td style="text-align: center;">۳۷۹۸</td> </tr> </table> <p>(آ) به جای علامت سوال کدام یک از اعداد (۴۲۳۵، ۲۴۸۸، ۸۴۰ یا ۴۲۴۸) را باید قرار داد؟ دلیل بنویسید. (ب) نقطه ذوب MgO و MgF_2 را با بیان دلیل مقایسه کنید.</p>	آئیون	F^-	O^{2-}	کاتیون			Na^+	۹۲۶	?	Mg^{2+}	۲۹۶۵	۳۷۹۸	۱/۲۵
آئیون	F^-	O^{2-}												
کاتیون														
Na^+	۹۲۶	?												
Mg^{2+}	۲۹۶۵	۳۷۹۸												
۹	<p>دلیل هر یک از عبارت‌های زیر را بنویسید.</p> <p>(آ) مولکول‌های CO در میدان الکتریکی جهت گیری می‌کنند. (ب) برای کاهش میزان اسیدی بودن خاک به آن آهک «CaO» می‌افزایند. (پ) با بازیافت آلومینیم، در مقایسه با تولید آن به روش هال، می‌توان هزینه تولید آلومینیم را کاهش داد. (ت) تیغه روی «Zn(s)» می‌تواند با محلول اسیدی «$\text{H}^+(aq)$» واکنش دهد.</p> <p>$E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_\gamma) = +0.00 \text{ V}$ ، $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.76 \text{ V}$</p>	۲												
۱۰	<p>با توجه به جدول زیر به پرسش‌های داده شده پاسخ دهید.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">Si-C</td> <td style="text-align: center;">Si-Si</td> <td style="text-align: center;">C-C</td> <td style="text-align: center;">پیوند</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۳۱۸</td> <td style="text-align: center;">۲۲۶</td> <td style="text-align: center;">۳۴۸</td> <td style="text-align: center;">میانگین آنتالپی (kJmol^{-1})</td> </tr> </table> <p>(آ) در ساخت مته و ابزار برش شیشه از الماس استفاده می‌شود یا سیلیسیم کربید؟ چرا؟ (ب) اگر سیلیسیم خالص، ساختاری همانند الماس داشته باشد، نقطه ذوب الماس کمتر است یا سیلیسیم؟ (پ) سختی سیلیسیم کربید (SiC) بیشتر است یا سیلیسیم؟</p>	Si-C	Si-Si	C-C	پیوند	۳۱۸	۲۲۶	۳۴۸	میانگین آنتالپی (kJmol^{-1})	۱/۲۵				
Si-C	Si-Si	C-C	پیوند											
۳۱۸	۲۲۶	۳۴۸	میانگین آنتالپی (kJmol^{-1})											
۱۱	<p>در سامانه تعادلی $2\text{NO}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{NO}(g) + \text{O}_2(g)$ با افزایش حجم سامانه در دمای ثابت پس از برقراری تعادل جدید، هر یک از کمیت‌های زیر چه تغییری کرده‌اند؟ برای هر مورد دلیل بنویسید.</p> <p>(آ) شمار مول‌های NO (ب) ثابت تعادل واکنش</p>	۱/۲۵												
	"ادامه سوالات در صفحه چهارم"													

مدت امتحان: ۱۱۰ دقیقه	تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۶/۱۷	رشته: ریاضی فیزیک - علوم تجربی
تعداد صفحه: ۴	ساعت شروع: ۸: صبح	نام و نام خانوادگی:
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی		دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزادسراسر کشور در فوبت شهریور ماه سال ۱۴۰۱

ردیف	سوالات (پاسخ نامه دارد)	نمره															
۱۲	<p>pH محلولی از یک نمونه شیشه پاک کن در دمای $C = 25^\circ$ برابر با $\log 2 = 0 / ۳$ است.</p> <p>(آ) کاغذ pH در این محلول به چه رنگی تغییر می کند؟ چرا؟</p> <p>ب) غلظت یون های هیدروکسید $[OH^-]$ و هیدروکسیوم $[H_3O^+]$ را در این محلول حساب کنید.</p>	۱/۷۵															
۱۳	<p>جدول زیر برخی داده ها برای واکنش میان گازهای هیدروژن و اکسیژن را در دمای $C = 25^\circ$ نشان می دهد، با توجه به آن پاسخ دهید.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>سرعت واکنش</th> <th>شرایط آزمایش</th> <th>شماره آزمایش</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ناچیز</td> <td>بدون حضور کاتالیزگر</td> <td>۱</td> </tr> <tr> <td>انفجاری</td> <td>ایجاد جرقه در مخلوط</td> <td>۲</td> </tr> <tr> <td>سریع</td> <td>در حضور پودر روی</td> <td>۳</td> </tr> <tr> <td>انفجاری</td> <td>در حضور توری پلاتینی</td> <td>۴</td> </tr> </tbody> </table> <p>(آ) نقش جرقه در آزمایش (۲) را بنویسید.</p> <p>ب) نقش توری پلاتینی در آزمایش (۴) چیست؟</p> <p>پ) انرژی فعال سازی واکنش در آزمایش (۳) بیشتر است یا آزمایش (۴)؟ دلیل بنویسید.</p> <p>ت) در آزمایش (۱) و (۳) تغییر آنتالپی (ΔH) واکنش ها را با نوشتن دلیل مقایسه کنید.</p>	سرعت واکنش	شرایط آزمایش	شماره آزمایش	ناچیز	بدون حضور کاتالیزگر	۱	انفجاری	ایجاد جرقه در مخلوط	۲	سریع	در حضور پودر روی	۳	انفجاری	در حضور توری پلاتینی	۴	۱/۵
سرعت واکنش	شرایط آزمایش	شماره آزمایش															
ناچیز	بدون حضور کاتالیزگر	۱															
انفجاری	ایجاد جرقه در مخلوط	۲															
سریع	در حضور پودر روی	۳															
انفجاری	در حضور توری پلاتینی	۴															
۱۴	<p>یکی از نیم واکنش های انجام شده در سلول الکتروولیتی هنگام برقراری آب به صورت زیر است:</p> $H_2O(l) \rightarrow H^+(aq) + O_2(g)$ <p>(آ) با وارد کردن نماد الکترون (e) در این نیم واکنش مشخص کنید، نیم واکنش آندی یا کاتدی است؟</p> <p>ب) نیم واکنش را موازن کنید.</p> <p>پ) این نیم واکنش در کدام قطب مثبت یا منفی سلول الکتروولیتی انجام می شود؟</p>	۱/۵															
	جمع نمره	۲۰															

۱ H ۱/۰۰۸	راهنمای جدول تناوبی عنصرها عدد اتمی ۶ C جرم اتمی میانگین ۱۲/۰۱										۲ He ۴/۰۰۳
۳ Li ۶/۹۴۱	۴ Be ۹/۰۱۲	۵ B ۱۰/۸۱	۶ C ۱۲/۰۱	۷ N ۱۴/۰۱	۸ O ۱۶/۰۰	۹ F ۱۹/۰۰	۱۰ Ne ۲۰/۱۸	۱۱ Na ۲۲/۹۹	۱۲ Mg ۲۴/۳۱	۱۳ Al ۲۶/۹۸	۱۴ Si ۲۸/۰۹
۱۹ K ۳۹/۱۰	۲۰ Ca ۴۰/۰۸	۲۱ Sc ۴۴/۹۶	۲۲ Ti ۴۷/۸۷	۲۳ V ۵۰/۹۴	۲۴ Cr ۵۲/۰۰	۲۵ Mn ۵۴/۹۴	۲۶ Fe ۵۵/۸۵	۲۷ Co ۵۸/۹۳	۲۸ Ni ۵۸/۶۹	۲۹ Cu ۶۳/۵۵	۳۰ Zn ۶۵/۳۹
۳۱ Ga ۶۹/۷۲	۳۲ Ge ۷۲/۶۴	۳۳ As ۷۴/۹۲	۳۴ Se ۷۸/۹۶	۳۵ Br ۷۹/۹۰	۳۶ Kr ۸۳/۸۰						

بلسمه تعالیٰ			
ردیف	واکنش b (۰/۲۵) از دیدگاه اتمی شمار بیشتری از اتم های واکنش دهنده به فراورده های سودمند تبدیل شده است. (۰/۵) (ص ۱۱۹)	۵	
۱	آ) شیمیابی (۰/۲۵) (ص ۸۱) ت) هیدروژنی (۰/۲۵) (ص ۷۲)	آ) نادرست (۰/۲۵) آرایش الکترونی و انادیم $\left[Ar\right]^{23}V^{3d^3}$ در حالت اکسایش (II) به صورت OF_2 برابر ۲ است. (۰/۲۵) (ص ۸۴) ب) درست (۰/۲۵) (ص ۹۹) پ) درست (۰/۲۵) (ص ۱۱۴)	۱
۲	آ) نادرست (۰/۲۵) عدد اکسایش اکسیژن در OF_2 برابر ۲ است. (۰/۲۵) (ص ۶۳) ت) نادرست (۰/۲۵) در سلول های سوختی هیدروژن - اکسیژن، بخش قابل توجهی از انرژی شیمیابی به انرژی الکتریکی تبدیل می شود. (۰/۲۵) (ص ۵۱)		
۳	آ) (b) (۰/۲۵) زیرا با یون های موجود در این آب ها رسوب نمی دهند. (۰/۲۵) (ص ۱۱) ب) آب دوست (۰/۲۵) (ص ۵) پ) آب (۰/۲۵) زیرا این ترکیب قطبی است و آب نیز قطبی است و شبیه شبیه را در خود حل می کند. (۰/۲۵) (ص ۴ و ۵) ت) (c) (۰/۲۵) (ص ۳۲)		
۴	آ) 0.005 molL^{-1} به ازای هر مول یون هیدرونیوم، یک مول یون فلوئورید تولید می شود، پس غلظت تعادلی این یون ها با هم برابر است. (۰/۲۵) (ص ۲۲)		
	ب) $K_a = \frac{[H^+][F^-]}{[HF]} \Rightarrow 5/9 \times 10^{-4} = \frac{(5 \times 10^{-3})^2}{[HF]} \Rightarrow [HF] = 4/24 \times 10^{-3} \text{ molL}^{-1}$		
۵	"ادامه راهنمای تصحیح در صفحه دوم"		

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: شیمی ۳	رشته: ریاضی و فیزیک - علوم تجربی	تعداد صفحه: ۳
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۶/۱۷	ساعت شروع: ۸ صبح
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت شهریور ماه سال ۱۴۰۱	مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی	
ردیف	راهنمای تصحیح	نمره

۶	(آ) HX (۰/۲۵) غلظت یون های موجود در محلول آن بیشتر است. (۰/۰) (ص ۱۸)	۰/۵
	(ب) HA (۰/۰) غلظت یون هیدرونیوم در محلول آن کمتر است. (۰/۰) (ص ۲۴)	۰/۷۵
۷	(آ) ساختار (۱) (۰/۰) (۰/۲۵)	۰/۲۵
	(ب) آهن (۰/۰) (۰/۲۵)	۰/۲۵
	(پ) اکسیژن (۰/۰) با گرفتن الکترون سبب اکسایش Fe شده است. (۰/۰) (ص ۴۰)	۰/۵
	(ت) خیر (۰/۰) پلاتین فلز نجیب است و اکسایش نمی یابد. (۰/۰) (ص ۵۸)	۰/۵
۸	(آ) $2488/0$ زیرا O^{3-} چگالی بار بیشتری نسبت به F^- دارد اما چگالی بار Mg^{2+} از Na^+ کمتر است. (۰/۰) (۰/۵)	۰/۷۵
	(ب) MgO نقطه ذوب بالاتری دارد. (۰/۰) زیرا آنتالپی فروپاشی شبکه و نقطه ذوب جامد های یونی اغلب رابطه مستقیم دارند. (۰/۰) (۰/۰) (ص ۸۱)	۰/۵
۹	(آ) مولکول های CO دو اتمی ناجور هسته بوده (۰/۰) و قطبی هستند. (۰/۰) (ص ۷۳)	۰/۵
	(ب) آهک اکسید فلز است (۰/۰) با آب باز تولید می کند. (۰/۰) (ص ۱۶ و ۱۴)	۰/۵
	(پ) فرایند هال به علت مصرف زیاد انرژی الکتریکی هزینه بالایی دارد. (۰/۰) همچنین بازیافت آلومینیم عمر یکی از مهم ترین منابع تجدیدناپذیر طبیعت را افزایش می دهد. (۰/۰) (ص ۶۲)	۰/۵
	(ت) چون E° روی کمتر از E° هیدروژن است (۰/۰) پس قدرت کاهندگی روی بیشتر است. (۰/۰) (ص ۴۲ و ۴۷)	۰/۵
۱۰	(آ) الماس (۰/۰) میانگین آنتالپی پیوند الماس بیشتر و سختی آن نیز بیشتر است. (۰/۰) (۰/۵)	۰/۷۵
	(ب) نقطه ذوب سیلیسیم کمتر است (۰/۰) (۰/۰)	۰/۲۵
	(پ) سیلیسیم کربید (۰/۰) (۰/۰)	۰/۲۵
۱۱	(آ) شمار مول های NO زیاد می شود (۰/۰) با افزایش حجم سامانه، فشار کم می شود (۰/۰) طبق اصل لوشاتلیه واکنش در جهت تعداد مول های گازی بیشتر پیش می رود (جهت برگشت) (۰/۰) (۰/۰)	۰/۷۵
	(ب) تغییر نمی کند. (۰/۰) چون دما ثابت است ثابت تعادل تغییر نمی کند. (۰/۰) (۰/۰)	۰/۵
	"ادامه راهنمای تصحیح در صفحه سوم"	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت شهریور ماه سال ۱۴۰۱	تاریخ امتحان : ۱۴۰۱/۶/۱۷ ساعت شروع: ۸: صبح
راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: شیمی ۳	رشته: ریاضی و فیزیک - علوم تجربی	تعداد صفحه: ۳

۱۲	(آ) آبی (۰/۲۵) محلول بازی است یا pH آن بزرگتر از ۷ است. (ب)	۰/۵
۱۳	(آ) تامین انرژی فعال سازی واکنش. (ب) کاتالیزگر. (پ) آزمایش (۳) (۰/۲۵) چون سرعت واکنش آن کمتر است. (ت) آنتالپی واکنش های (۱) و (۳) برابر است. (۰/۲۵) آنتالپی واکنش دهنده ها و فراورده ها با استفاده از کاتالیزگر تغییر نمی کند. (۰/۲۵) (ص) (۹۷)	۰/۲۵ ۰/۲۵ ۰/۵ ۰/۵
۱۴	(آ) نیم واکنش آندی (۰/۲۵) $H_2O(l) \longrightarrow H^+(aq) + O_2(g) + e^-$ (ب) هر ضریب درست ۰/۲۵ نمره، جمعا ۰/۷۵ نمره (پ) قطب مثبت (۰/۲۵)	۰/۵ ۰/۷۵ ۰/۲۵
۲۰	همکار گرامی خدا قوت .	جمع نمره

همکار محترم: لطفا در صورت مشاهده پاسخ های صحیح و مشابه کتاب درسی (به جز به کار بردن تناسب در حل مسایل عددی) نمره منظور فرمایید.

AzmoonFree.ir



هرچی برای کنکور و امتحانات نهایی لازم
داری رو کامل رایگان برات فراهم میکنیم.



پخش سوالات آزمون های آزمایشی

AzmoonFree.ir

برای ورود به سایت کلیک کن